

Jeffersonia

čeleď: Berberidaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest prezidenta Thomase Jeffersona (1746 - 1826). Existuje pouze 1 druh.

Jeffersonia diphylla

synonyma: J. bartonis, J. binata, J. diphylla f. diphylla, J. lobata

oblasti: Alabama, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky (9 -) 20 - 30 (i 45)cm a podobné šířky. Listy jsou ledvinité s 2mi úkrojky, vlastní lístky jsou kulaté, špičaté, s 2 - 5ti zuby v horní 1/2, šedě zelené, dlouhé 1,2 - 4cm, široké 0,6 - 2,5cm, v dospělosti dlouhé 6 - 13cm, široké 3 - 7cm a dlouze řapíkaté. Kvete bílými zvonkovitými květy, kališní lístky jsou eliptické až obvejčité, dlouhé 0,7 - 1,5cm, široké 4 - 6mm, korunní lístky eliptické až obvejčité, bílé, dlouhé 1,1 - 2,2cm a široké 0,9 - 1,2cm a spodní strana je namodralá. Plodem jsou kožovité tobolky délky 1,8 - 3,8cm, široké 0,8 - 1,7cm a obsahují podlouhlá černá semena délky 4 - 7mm a šířky 2mm. Růst je pomalý.

Vyhovují ji vlhké půdy ve stínu až polostínu, chlad a půda bohatá na živiny.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/jeffersonia-diphylla/>

<https://www.rostliny.net/>