

Neobrachyactis

čeleď: Asteraceae

Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Neobrachyactis anomala

synonyma: *Aster menthodorus*, *Brachyactis anomalum*, *Brachyactis indica*, *Brachyactis menthodora*, *Erigeron anomalus*

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Nepál, Pákistán, V Himálaj, Z Himálaj

Roste v Indii, Pákistánu, Číně, Bhútánu a Nepálu jako trvalka. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy jsou úzce kopinaté nebo vejčité, pilovité, dlouhé 3 - 10cm, široké 1 - 3cm, řapíky jsou dlouhé 1,5 - 6cm a horní listy jsou přisedlé. Květenstvím je úbor po 1 - 4ks s průměrem 1,5cm, zákrove je 2řadý, vnější 2 zákrovní lístky jsou zelené, listovité, dlouhé 1cm, vnitřní jsou úzce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 7mm, okvětní lístky jsou žlutě modré, bohaté, 2řadé, dlouhé 5 - 6mm, terčové jsou trubkovité, žluté, 4laločné, dlouhé 4 - 5mm a laloky jsou kopinaté. Plodem je úzce eliptická tmavě hnědá nažka délky 3,5mm s 2ma žebry s chmýrem délky 4 - 5mm.

Neobrachyactis obovata

oblasti: Afganistán, Irák, Írán

Roste v Afganistánu, Íránu a Iráku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 3 - 10cm. Povrch je šedě plstnatý. Spodní listy jsou kopistovitě kulaté, tupé, na bázi klínovitá, krátce řapíkaté, lodyžní jsou drobné, eliptické a tupé. Květenstvím je samostatný nebo párovitý úbor, zákrov je světle zelený, ochlupený a okvětní lístky jsou modře fialové.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Neobrachyactis pubescens

synonyma: *Brachyactis pubescens*, *Brachyactis robusta*, *Conyza edelbergii*, *Conyza pubescens*, *Erigeron robustum*, *Erigeron robustus*

oblasti: Afganistán, Čína, Indie, Nepál, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pákistánu, Indii, Číně a Nepálu jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Stonek je vzpřímený, větvený a bohatě olistěný. Přizemní listy jsou eliptické, dlouhé 3 - 6cm, široké 1,5 - 3cm, řapíky dlouhé 3 - 4cm, lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, obvejčité až úzce eliptické, špičaté, pilovité, dlouhé 1,5 - 7cm a široké 0,7 - 2,5 (i 3)cm. Květenstvím je úbor o průměru 1 - 2cm v hrozeniu, zákrov je 2 - 3řadý, zákrovní lístky jsou podlouhlé nebo kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 5 - 8mm, okvětních samičích lístků je 25 - 30ks, terčové květy jsou oboupohlavné, světlé a dlouhé 4 - 5mm. Plodem je zploštělá nažka délky 1,5 - 2mm s chmýrem délky 4 - 5mm.

Neobrachyactis roylei

synonyma: Aster umbrosus, Brachyactis alpina, Brachyactis roylei, Brachyactis umbrosa, Brachyactis wangtuensis, Conyza roylei, Conyza umbrosa, Conyza wangtuensis, Erigeron umbrosus

oblasti: Afganistán, Čína, Indie, Írán, Kazachstán, Nepál, Pákistán, Rusko

Roste v Rusku, Kazachstánu, Íránu, Afganistánu, Pákistánu, Indii, Číně a Nepálu jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Stonek je zpravidla od báze větvený a ochlupený. Listy jsou obvejčité nebo obkopynaté, pilovité, ochlupené, horní menší, přizemní jsou dlouhé 1 - 4cm a široké 0,5 - 2cm. Květenstvím je úbor o průměru 0,6 - 1 (i 1,2)cm v hroznu, zákrov je 1/2kulatý až zvonkovitý, 2 - 4řadý, zákrovní lístky čárkovité nebo kopynaté, dlouhé 5 - 7mm, široké 1mm, okvětních lístků je mnoho, jsou bílé, dlouhé 2,5mm, terčové květy jsou chudé, trubkovité, žluté a dlouhé 3,5mm. Plodem je zploštělá obvejčitá až kopynatá nažka délky 2 - 3 (i 4)mm s chmýrem délky 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>