

# Neobrachyactis anomala

synonyma: Aster menthodorus, Brachyactis anomalum, Brachyactis indica, Brachyactis menthodora, Erigeron anomalus

čeleď: Asteraceae

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Nepál, Pákistán, V Himálaj, Z Himálaj

Roste v Indii, Pákistánu, Číně, Bhútánu a Nepálu jako trvalka. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy jsou úzce kopinaté nebo vejčité, pilovité, dlouhé 3 - 10cm, široké 1 - 3cm, řapíky jsou dlouhé 1,5 - 6cm a horní listy jsou přisedlé. Květenstvím je úbor po 1 - 4ks s průměrem 1,5cm, zákrove je 2řadý, vnější 2 zákrovní lístky jsou zelené, listovité, dlouhé 1cm, vnitřní jsou úzce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 7mm, okvětní lístky jsou žlutě modré, bohaté, 2řadé, dlouhé 5 - 6mm, terčové jsou trubkovité, žluté, 4laločné, dlouhé 4 - 5mm a laloky jsou kopinaté. Plodem je úzce eliptická tmavě hnědá nažka délky 3,5mm s 2ma žebry s chmýrem délky 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>