

Neobrachyactis roylei

synonyma: Aster umbrosus, Brachyactis alpina, Brachyactis roylei, Brachyactis umbrosa, Brachyactis wangtuensis, Conyza roylei, Conyza umbrosa, Conyza wangtuensis, Erigeron umbrosus

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Čína, Indie, Írán, Kazachstán, Nepál, Pákistán, Rusko

Roste v Rusku, Kazachstánu, Íránu, Afganistánu, Pákistánu, Indii, Číně a Nepálu jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Stonek je zpravidla od báze větvený a ochlupený. Listy jsou obvejčité nebo obkopinaté, pilovité, ochlupené, horní menší, přizemní jsou dlouhé 1 - 4cm a široké 0,5 - 2cm. Květenstvím je úbor o průměru 0,6 - 1 (i 1,2)cm v hroznu, zákrov je 1/2kulatý až zvonkovitý, 2 - 4řadý, zákrovní lístky čárkovité nebo kopinaté, dlouhé 5 - 7mm, široké 1mm, okvětních lístků je mnoho, jsou bílé, dlouhé 2,5mm, terčové květy jsou chudé, trubkovité, žluté a dlouhé 3,5mm. Plodem je zploštělá obvejčitá až kopinatá nažka délky 2 - 3 (i 4)mm s chmýrem délky 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>