

## Neolitsea zeylanica

synonyma: *Laurus camphora*, *Laurus involucrata*, *Laurus nitida*, *Laurus verticillata*, *Litsea ceylanica*, *Litsea pseudoculitlawan*, *Litsea zeylanica*, *Malapoenna involucrata*, *Malapoenna pseudoculitlawan*, *Neolitsea foliolosa*, *Neolitsea involucrata*, *Tetradenia pseudoculitlawan*, *Tetradenia zeylanica*, *Tetranthera foliosa*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Austrálie, Guangxi, JV Asie

Roste v Číně, jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, úzce vejčité až podlouhlé, zašpičatělé, dlouhé 7 - 11cm, široké 2,5 - 4cm, spodní strana je nasivělá, báze klínovitá, žilnatina na bázi 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenstvím je úžlabní prakticky přisedlý 4 - 5tikvětý okolík, vlastní květy mají 2mm stopku a samčí obal se 4mi cípy.

<https://www.rostliny.net/>