

Chamaecytisus rochelii (Čilimník Rochelův)

synonyma: Chamaecytisus albus subsp. obscurus, Chamaecytisus ambiguus, C. subsp. ambiguus, C. var. angustifolius, C. var. bulgaricus, Cytisus albus subsp. obscurus, Cytisus ambiguus, Cytisus austriacus var. rochelii, Cytisus leucanthus subsp. obscurus, Cytisus leucanthus var. angustifolius, Cytisus leucanthus var. bulgaricus, Cytisus leucanthus var. obscurus, Cytisus rochelii, Cytisus supinus var. angustifolius, Cytisus supinus var. bulgaricus, Cytisus supinus var. obscurus, Cytisus villosus

čeleď: Fabaceae

oblasti: Bulharsko, Jugoslávie, Ukrajina

Roste v Bulharsku, bývalé Jugoslávii až Ukrajině v podobě opadavého vzpřímeného ochlupeného žlutě zeleného keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou 3četné, vlastní lístky úzce kopinaté až mírně obkopinaté, špičaté, oboustranně ochlupené, dlouhé 1 - 3cm a báze je klínovitá. Květenství je hlávkovitě chocholičnaté, 12 - 18tikvěté, vlastní květy jsou dlouhé 2cm, žluté, hnědě tečkované, kalich je kuželovitě zvonkovitý, ochlupený, dlouhý 1 - 1,2cm, koruna má vně ochlupenou pavézu délky 1,8 - 2cm, křídla jsou dlouhá 1,5 - 1,7cm a člunek je kratší. Plodem je zahnutý ochlupený lusk.

<https://www.rostliny.net/>