

Operculina turpethum

synonyma: *Argyreia alata*, *Argyreia alulata*, *Convolvulus anceps*, *Convolvulus gaudichaudii*, *Convolvulus riedlei*, *Convolvulus triqueter*, *Convolvulus turpethum*, *Ipomoea anceps*, *Ipomoea diplocalyx*, *Ipomoea saundersiana*, *Ipomoea triquetra*, *Ipomoea turpethum*, *Ipomoea turpethum* var. *anceps*, *Merremia triquetra*, *Merremia turpethum*, *Operculina triquetra*, *O.* var. *heterophylla*, *O.* var. *humilior*, *Spiranthera turpethum*, *Turpethum australe*, *Turpethum indicum*

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Brazílie, Filipíny, Indie, Indonésie, J Čína, JV Čína, Madagaskar, Mosambik, Myanmar (Barma), Nová Kaledonie, Pákistán, Papua-Nová Guinea, S Austrálie, Somálsko, Srí Lanka, Střední Amerika, Tchaj-wan, Tichý oceán

Roste od východní Afriky přes, Madagaskar a Indii po jihovýchodní Asii, Austrálii a Tichý oceán v podobě popínavé byliny. Dorůstá délky 4 (i 5)m. Lodyha je hranatá až úzce 3 - 5tikřídlatá, může být ochlupená a načervenalá. Listy jsou střídavé, vejčité nebo kopinaté, špičaté, zvlňené, mohou být ochlupené, dlouhé (4 -) 5 - 14 (i 15)cm, báze srdčitá nebo zakulacená a řapíky jsou dlouhé 2 - 10cm. Kvete po (1 -) 2ks v paží listů, listeny podlouhlé až vejčité, ochlupené, dlouhé 1 - 2,5cm, vlastní květy mají až 3cm stopku, jsou oboupohlavné, kališní lístky vejčité, nestejně, vnější 2 hrotité, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2cm, vnitřní 3 jsou kratší, prakticky holé, koruna je nálevkovitá, bílá, uvnitř na bázi občas nažloutlá, vně žláznatá a dlouhá 3,5 - 4cm. Plodem je tobolka uzavřená v kalichu, průměru 1,5cm a obsahuje černá semena délky 6mm.

Vyhovují ji křoviny, okraje vodních toků, polí a cest.

<https://www.rostliny.net/>