

Ottelia (Otélie)

synonyma: *Benedictaea*, *Boottia*, *Oligolobos*, *Xystrolobos*

čeleď: Hydrocharitaceae

Roste ve vodách tropů Afriky, Asie, Austrálie, Nové Kaledonie a v Brazílii. Listy jsou opadavé, pouze přízemní, řapíkaté, zpravidla pochvaté, občas plovoucí, čárkovité až široce vejčité, s 3 - 11ti žilkami. Květy jsou jednopohlavné nebo oboupohlavné, samčí dlouze stopkaté, zbývající max. krátce řapíkaté, kališní lístky 3, zelené, čárkovité, podlouhlé nebo vejčité, korunní lístky také 3, kulaté až široce obvejčité, mnohem delší než kališní. Plody jsou válcovité až kuželovité a obsahují mnoho malých zpravidla ochlupených semen.

Vyhovuje jí čerstvá voda.

Ottelia acuminata

synonyma: *Boottia acuminata*

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminata* - Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Sichuan, Yunnan
- var. *crispa* - Yunnan
- var. *jingxiensis* - Guangxi
- var. *lunanensis* - Yunnan

Ottelia alismoides (Otélie žabníkovitá)

synonyma: *Boottia alata*, *Boottia bodinieri*, *Boottia lanceolata*, *Boottia thorelii*, *Damasonium alismoides*, *Damasonium indicum*, *Damasonium javanicum*, *Damasonium lactucifolium*, *Damasonium lancifolium*, *Damasonium timorense*, *Damasonium tranquebariense*, *Hydrocharis bodinieri*, *Hymenotheca latifolia*, *O. alata*, *O. alismoides* f. *lacustris*, *O. alismoides* f. *oryzeturum*, *O. alismoides* var. *cordifolia*, *O. alismoides* var. *javanica*, *O. alismoides* var. *lacustris*, *O. alismoides* var. *lanceolata*, *O. alismoides* var. *oryzeturum*, *O. bodinieri*, *O. condorensis*, *O. dioecia*, *O. ensiformis*, *O. hoffmeisteri*, *O. indica*, *O. japonica*, *O. javanica*, *O. lactucifolia*, *O. lanceolata*, *O. philippinensis*, *O. thorelii*, *Stratiotes alismoides*

oblasti: Chabarovsko, Čína, Indie, Itálie, Kalifornie, Louisiana, Melanésie, Missouri, Nová Guinea, Pákistán, Přímořský kraj, S Austrálie, SV Afrika, Texas

Roste na jihovýchodní Sibiři, Číně, Indii, jihovýchodní Asii, Nové Guineji, Šalamounových ostrovech a Austrálii. Listy jsou tenké, průsvitné, světle zelené, z části až plovoucí, úzce kopinaté, max. krátce řapíkaté, plovoucí široce vejčité až prakticky kulaté, zašpičatělé, dlouhé 6 - 20 (i 22)cm, široké 4,5 - 16 (i 20)cm, báze až hluboce srdčitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 žilek a řapíky jsou dlouhé 8 - 50cm. Květenstvím je 2laločný vejčité eliptický toulec délky 2,5 - 4,5 (i 6)cm na 10 - 30cm stopce, laloky jsou špičaté, vlastní květy jsou přisedlé, oboupohlavné, kališní lístky úzce podlouhlé, zašpičatělé,

dlouhé 1 - 1,6cm, široké 2 - 4mm, korunní lístky jsou obvejčité až kulovité, zašpičatělé, zpravidla s bílou nebo žlutou skvrnou na bázi, dlouhé 2 - 3mm a široké 2 - 2,5mm. Plody jsou úzce eliptické, dlouhé 2 - 4cm, průměru 3 - 4cm a obsahují semena délky 1 - 2mm.

Ottelia balansae

synonyma: *Boottia sinensis*, *Oligolobos balansae*, *O. demersa*, *O. sinensis*

oblasti: J Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu.

Ottelia brachyphylla

synonyma: *Boottia brachyphylla*, *Boottia parviflora*

oblasti: Súdán

Roste v Súdánu.

Ottelia brasiliensis

synonyma: *Benedictaea brasiliensis*, *Damasonium brasiliense*, *Damasonium brasiliensis*

oblasti: Brazílie, Paraguay, SV Argentina

Roste v Brazílii, Paraguayi a Argentině.

Ottelia cordata

synonyma: *Boottia cordata*, *Boottia heterophylla*, *O. heterophylla*

oblasti: Hainan, Kambodža, Myanmar (Barma), Thajsko

Roste na Hainanu, Thajsku, Myanmaru a Kambodži v jezerech, kanálech a jiných pomalu tekoucích vodách. Vytváří 2 druhy listů, submerzní jsou úzce eliptické, dlouhé 30 - 60cm, široké 4,5 - 10cm, natantní jsou kopinaté až úzce vejčité, špičaté, dlouhé 10 - 20cm, široké 4 - 10cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,2m. Kvete jednopohlavními květy v úzce vejčitém toulci délky 3,5 - 8cm, šířky 1,5 - 2cm se 6ti podlouhlými žebry, ze samčích toulců vyrůstá 10 - 30 květů, vlastní květy mají 3 kopinaté až vejčité žlutě zelené kališní lístky, korunní lístky jsou také 3, obvejčité, bílé, dlouhé 2,5 - 4,5cm, ze samičích toulců vyrůstá 1 květ s podobně velkými lístky. Plod je podlouhlý, dlouhý 4 - 4,5cm a široký 1,6 - 2cm.

Ottelia cylindrica

synonyma: *Boottia cylindrica*, *Boottia stratiotes*, *O. stratiotes*

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Zambie

Roste v Demokratické Republice Kongo, Zambii a Angole.

Ottelia emersa

oblasti: Guangxi

Roste v Číně.

Ottelia exserta

synonyma: *Boottia exserta*, *Boottia macrantha*, *Boottia mossambicensis*, *Boottia rautaneni*, *Boottia schinziana*, *O. macrantha*, *O. schinziana*, *O. somalensis*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Somálsko

Roste od Somálska po JAR.

Ottelia fengshanensis

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Ottelia fischeri

synonyma: *Boottia fischeri*

oblasti: Keňa, Mosambik

Roste od Keni po Masambik.

Ottelia guanyangensis

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Ottelia kunenensis

synonyma: *Boottia kunenensis*

oblasti: Angola, Botswana, Namibie, Zambie

Roste v Zambii, Angole, Botswaně a Namibii.

Ottelia lisowskii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Zambie

Roste v Demokratické Republice Kongo a Zambii.

Ottelia mesenterium

synonyma: *Boottia mesenterium*

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Ottelia muricata

synonyma: *Boottia aschersoniana*, *Boottia muricata*

oblasti: J Afrika, Střední Afrika

Roste od střední po jižní Afriku.

Ottelia obtusifolia

synonyma: *O. luapulana*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Zambie

Roste v Zambii a Demokratické Republice Kongo.

Ottelia ovalifolia (Otélie vejčitolistá)

synonyma: *Damasonium ovalifolium*

oblasti: Austrálie, Melanésie, Nový Zéland

Roste v Austrálii, zavlečená byla na Nový Zéland, Vanuatu a Šalamounovy ostrovy.

Ottelia profundecordata

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Středoafriická Republika

Roste ve Středoafriické Republice a Demokratické Republice Kongo.

Ottelia scabra

synonyma: *Boottia scabra*

oblasti: Jižní Súdán, Uganda

Roste v Jižním Súdánu a Ugandě.

Ottelia ulvifolia

synonyma: *Damasonium ulvaefolium*

oblasti: J Afrika, Madagaskar

Roste v tropické a jižní Africe a Madagaskaru v podobě vodní rostliny. V substrátu vytváří krátký oddenek. Listy vytvářejí růžici, jsou světle zelené s hnědě červenými skvrnami a čárkami, dlouhé až

50cm, široké do 8cm a řapíky má délku až 30cm. Kvete žlutými květy.

Množí se semeny.

Ottelia verdickii

synonyma: *O. gigas*, *O. verdickii* var. *elanga*

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Tanzánie, Zambie

Roste v Tanzánii, Demokratické Republice Kongo, Zambii a Angole.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/ottelia-cordata/>

<https://www.rostliny.net/>