

Ensete ventricosum (Nepravý banánovník)

synonyma: *Ensete arnoldianum*, *Ensete bagshawei*, *Ensete buchananii*, *Ensete davyae*, *Ensete edule*, *Ensete fecundum*, *Ensete holstii*, *Ensete laurentii*, *Ensete proboscideum*, *Ensete ruandense*, *Ensete rubronervatum*, *Ensete schweinfurthii*, *Ensete ulugurense*, *E. var. montbeliardii*, *Musa arnoldiana*, *Musa bagshawei*, *Musa buchananii*, *Musa davyae*, *Musa ensete*, *Musa ensete var. montbeliardii*, *Musa fecunda*, *Musa holstii*, *Musa kaguna*, *Musa laurentii*, *Musa martretiana*, *Musa proboscidea*, *Musa ruandensis*, *Musa rubronervata*, *Musa schweinfurthii*, *Musa ulugurensis*, *Musa ventricosa*

čeleď: Musaceae

oblasti: Etiopie, Tropická Afrika

Roste v tropické Africe jako trvalka. Dorůstá výšky 10m. Listy jsou dlouhé až 3,5m a centrální žebro je červené. Květenství je klasovité, dlouhé 3m a listeny jsou červené. Plody jsou v mládí jedlé, ale ve zralosti již jedlé nejsou. Ke konzumaci se používají škrobovitě oddenky a stonky.

<https://www.rostliny.net/>