

# Noronhia

synonyma: Binia, Campanolea, Dekindtia, Pogenda

čeleď: Oleaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest španělského botanika jménem Francisco Noronha (1748 - 1788). Roste na Madagaskaru a Komorských ostrovech v podobě opadavého nebo stálezeleného stromu nebo keře a zavlečený byl na Mauricius, Reunion a na Bermudy. Listy jsou vstřícné (i přeslenité) a řapíky bývají krátké. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, latnaté nebo hroznovité (i samostatné květy), vlastní květy jsou 4četné, kalich malý, zvonkovitý, laloky 3úhlé, zašpičatělé, zpravidla nestejně, koruna je tuhá a zvonkovitá. Plody jsou kulovité a obsahují velká semena.

## Noronhia africana

synonyma: Chionanthus africanus, Linociera africana, Linociera angolensis, Linociera dasyantha, Linociera fragrans, Linociera giordani, Linociera johnsonii, Linociera latipetala, Linociera mildbraedii, Linociera oreophila, Mayepea africana, Olea mildbraedii var. cuspidata, Olea mildbraedii var. lanceolata

## Noronhia alleizettei

## Noronhia ambrensis

## Noronhia aminae

## Noronhia ankaranensis

synonyma: *N. luteola* subsp. *ankaranensis*, *N. luteola* var. *ankaranensis*

## Noronhia armandiana

## Noronhia battiscombei

synonyma: *Chionanthus battiscombei*, *Dekindtia africana*, *Linociera battiscombei*

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 11 (i 30)m. Borka je hladká, šedá nebo hnědá. Větve jsou rovné, vstřícné a občas s lenticelami. Listy jsou eliptické nebo obvejčité, tupé nebo zašpičatělé, lesklé, kožovité, tmavě zelené, dlouhé 4,5 - 13cm, široké 1,5 - 5cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, spodní strana světle zelená a řapíky jsou dlouhé 3 - 9mm. Květenství je úžlabní, přisedlé, husté, vlastní květy jsou bílé nebo nažloutlé, aromatické, koruna je dlouhá 5 - 7mm, trubka krátká a laloky čárkovité. Plody jsou zelené, růžově fialové nebo černé, eliptické, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 1cm.

## Noronhia boinensis

Noronhia boivinii

Noronhia brevituba

Noronhia broomeana

synonyma: Chionanthus broomeanus, Chionanthus broomeanus var. broomeanus, Linociera broomeana

Noronhia buxifolia

synonyma: N. buxifolia var. quadriloba

Noronhia cameroonensis

Noronhia camptoneura

synonyma: Chionanthus camptoneurus, Linociera camptoneura

Noronhia candicans

Noronhia capuronii

Noronhia christenseniana

Noronhia clarinerva

Noronhia cochleata

Noronhia comorensis

Noronhia congesta

synonyma: Chionanthus mannii subsp. congestus, Linociera congesta, N. mannii subsp. congesta

Noronhia cordifolia

synonyma: Chionanthus cordifolius

Noronhia coriacea

Noronhia crassinodis

Noronhia crassiramosa

Noronhia cruciata

Noronhia cuspidata

Noronhia dauphinensis

Noronhia decaryana

Noronhia densiflora

Noronhia disjuncta

Noronhia divaricata

Noronhia domatifera

Noronhia ecoronulata

Noronhia edentata

synonyma: *N. emarginata* var. *edentata*

Noronhia emarginata

synonyma: *Linociera flavicans*, *N. binia*, *N. chartacea*, *N. emarginata* var. *garcinioides*, *Notelaea flavicans*, *Olea emarginata*, *Thouinia flavida*

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Karibik, Madagaskar

Roste na Madagaskaru v podobě stálezeleného keře nebo stromu a zavlečený byl na Mauricius, Réunion a na Bermudy. Dorůstá výšky 3 - 15m. Borka je hladká. Listy jsou vstřícné, eliptické až obvejčité, dlouhé do 16cm a široké 10cm. Kvete drobnými světlými bíle žlutými 4četnými květy. Plodem jsou kulaté zašpičatělé žluté až růžově fialové či tmavě hnědé peckovice obsahující semeno délky 1 - 1,2cm.

Vyhovuje jí pobřeží, polostín nebo plné slunce a dobře propustná kyselá i zásaditá půda. Dobře snáší zasolení.

Noronhia foveolata

synonyma: Chionanthus foveolatus, Chionanthus foveolatus subsp. foveolatus, Linociera foveolata, Olea foveolata

Noronhia gautieri

Noronhia gracilipes

Noronhia grandifolia

Noronhia greeniana

Noronhia humbertiana

Noronhia humblotiana

synonyma: N. mangorensis var. humblotiana

Noronhia incurvifolia

synonyma: Chionanthus incurvifolius, Linociera incurvifolia, Linociera incurvifolia f. planifolia, N. incurvifolia var. planifolia

Noronhia insularis

synonyma: Chionanthus insularis

Noronhia intermedia

Noronhia introversa

Noronhia jeremii

Noronhia lanceolata

Noronhia latifolia

Noronhia leandriana

Noronhia linearifolia

Noronhia linocerioides

Noronhia longipedicellata

Noronhia louvelii

Noronhia lowryi

Noronhia luteola

synonyma: *N. luteola* subsp. *luteola*

Noronhia macrocarpa

Noronhia macrophylla

synonyma: *Chionanthus boutonii*, *Linociera macrophylla*, *N. boutonii*, *Olea macrophylla*

Noronhia maculata

Noronhia mangorensis

Noronhia mannii

synonyma: *Chionanthus mannii*, *Chionanthus mannii* subsp. *mannii*, *Linociera mannii*, *Mayepea mannii*

Noronhia marinae

Noronhia marojejyensis

Noronhia martiniana

Noronhia mayottensis

synonyma: *Linociera mayottensis*

Noronhia mildbraedii

synonyma: *Campanolea mildbraedii*, *Chionanthus mildbraedii*, *Olea mildbraedii*

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2,5 - 6 (i 12)m. Listy jsou eliptické až úzce obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 5 - 16cm, široké 1,5 - 6cm a báze je klínovitá. Květenstvím je řídká úžlabní lata délky 3 - 9cm, vlastní květy jsou světle žluté nebo červeně žluté, dlouhé 6 - 9mm, trubka krátká a laloky vejčité. Plody jsou červené, eliptické a dlouhé 1,6 - 1,7cm.

### Noronhia myrtoides

### Noronhia nilotica

synonyma: Chionanthus niloticus, Linociera holtzii, Linociera lingelsheimiana, Linociera macrura, Linociera nilotica, Linociera sudanica, Mayepea nilotica

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě mnohokmenného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2,4 - 4 (i 18)m. Borka je žlutě hnědá. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, tupé nebo zašpičatělé, dlouhé 6 - 15cm, široké 2,5 - 5cm a báze je klínovitá. Květenstvím je úžlabní několikakvětý vrcholík délky 0,5 - 1,6 (i 6)cm, vlastní květy jsou bílé nebo béžové, aromatické, dlouhé 4 - 7mm, trubka je krátká, cípe úzce vejčité a na vrcholu kápovitě. Plody jsou modře černé, eliptické až prakticky kulaté a dlouhé do 2,5cm.

### Noronhia obcordifolia

### Noronhia oblanceolata

### Noronhia obovata

synonyma: Chionanthus ayresii, N. ayresii, Olea obovata

### Noronhia obtusifolia

synonyma: Chionanthus obtusifolius, Linociera obtusifolia, Linociera obtusifolia var. minoriflora, Linociera obtusifolia var. thouarsii, N. cernua, N. obtusifolia var. minoriflora, N. obtusifolia var. thouarsii, Olea cernua, Olea obtusifolia, Pogenda cernua

### Noronhia olearia

synonyma: Olea ambrensis

### Noronhia orientalis

### Noronhia ovalifolia

### Noronhia patricei

### Noronhia pegleri

synonyma: Chionanthus peglerae, Linociera peglerae, Linociera pegleriae, Olea peglerae

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 4 - 20m. Borka je světle šedá až šedě hnědá, hladká a zpravidla s lenticelami. Listy jsou vstřícné, obvejčité až úzce eliptické, oboustranně zúžené, kožovité, lesklé, tmavě zelené, dlouhé 8 - 13cm, široké 3 - 6,5cm, na spodní straně v paždí ochlupené a řapíky jsou dlouhé do 1cm. Květenství je úžlabní, dlouhé do 5cm, vlastní květy jsou béžově bílé a dlouhé do 6mm. Plody jsou růžově fialové až černé, bíle tečkované, vejčité, dužnaté, dlouhé do 2,5cm a široké 1,5cm.

Noronhia peracuminata

Noronhia perrieriana

Noronhia pervilleana

synonyma: *Olea pervilleana*

Noronhia planifolia

Noronhia populifolia

Noronhia randrianaivoi

Noronhia ratovosonii

Noronhia retusifolia

Noronhia richardii

Noronhia richardsiae

synonyma: *Chionanthus richardsiae*

Noronhia rollandii

Noronhia rostrata

Noronhia sambiranensis

Noronhia schatzii

Noronhia seyrigi

Noronhia silvatica

Noronhia similis

Noronhia spinifolia

Noronhia stevensiana

Noronhia tefyana

Noronhia tetrandra

Noronhia tropophylla

synonyma: Chionanthus tropophyllus, Linociera tropophylla, Linociera tropophylla var. angustata, N. tropophylla var. angustata

Noronhia tubulosa

Noronhia urceolata

Noronhia variabilis

Noronhia verrucosa

Noronhia verticillata

Noronhia verticilliflora

<https://www.rostliny.net/>