

Frangula capreifolia

synonyma: *Rhamnus capreifolia*, *Rhamnus capreifolia* var. *grandifolia*, *Rhamnus capreifolia* var. *matudae*

čeleď: Rhamnaceae

oblasti: Guatemala, J Mexiko, Kostarika, Salvador, Veracruz

Roste v Mexiku, Guatemale, Salvadoru a Kostarice v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 15 - 23m při průměru kmene 30cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou záhy opadavé, tmavé, ochlupené a dlouhé 2 - 3mm. Listy jsou široce eliptické až obvejčité nebo úzce kopinaté (i vejčité), špičaté až dlouze zašpičatělé, mohou být podvinuté, vroubkované až pilovité, zelené až sivě zelené, mohou být ochlupené, dlouhé 3,6 - 18cm, široké 1,9 - 8,5cm, báze je klínovitá až zakulacená, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,7cm. Květenstvím je až 21tkvětý úžlabní okolík, vlastní květy mají 2 - 6mm stopku, jsou oboupohlavné, 5tičetné, kališní lístky dlouhé 1 - 1,8mm a široké 0,7 - 1,5mm. Plodenství je 4 - 7mičetné, vlastní plody mají 2 - 8mm stopku, jsou podlouhlé nebo kulaté, černé nebo tmavě růžově fialové, dlouhé 4 - 8mm a ve spodní části ochlupené. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *capreifolia*/F. *capreifolia*/*Rhamnus capreifolia* subsp. *typica* - východní Mexiko; výška 1,5 - 18m; borka zeleně šedá až světle šedá; větve v mládí ochlupené; palisty tmavé, ochlupené, záhy opadavé, dlouhé 2 - 3mm; listy široce eliptické, mírně vejčité až obvejčité, špičaté nebo zašpičatělé v délce do 1 - 2cm, mírně podvinuté, řídce vroubkované, kožovité, zelené, dlouhé 3,6 - 16,7cm, široké 1,9 - 7,7cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 12 párů žilek a řapíky dlouhé 0,6 - 1,4cm; květenstvím je 1 - 15tkvětý přisedlý okolík nebo kytice, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, kališních lístků je 5, jsou dlouhé 1 - 1,8mm a široké 1 - 1,5mm; plodenství je až 7mičetné, úžlabní, žlutě hnědé až černé kulaté peckovice mají 3 - 8mm stopku, průměr 4 - 6mm
- var. *grandifolia* - Mexiko, Guatemala, Salvador a Kostarika; výška 1,5 - 23m; větve v mládí ochlupené; palisty tmavé, ochlupené, záhy opadavé; listy široce eliptické, vejčité až úzce obvejčité, zašpičatělé, podvinuté, řídce vroubkované nebo drobně vroubkované pilovité, sivě zelené, ochlupené, dlouhé 3,8 - 18cm, široké 2,1 - 8,3cm, báze je klínovitá až zakulacená, spodní strana ochlupená, spodní strana ochlupená; květenstvím je 6 - 21tkvětý úžlabní okolík na max. 1,2cm stopce a vlastní květy mají 3 - 6mm stopku; plody mají 3 - 7mm stopku, jsou podlouhlé až kulaté, červené, ve spodní části ochlupené, dlouhé 6 - 8mm a široké 5 - 7mm
- var. *matudai* - Veracruz; výška 5 - 6m; větve v mládí na konci načervenalé; palisty ochlupené, tmavé, záhy opadavé, dlouhé 2 - 3mm; listy eliptické až obvejčité, špičaté, mohou být podvinuté, mohou být drobně pilovité nebo vroubkované, mohou být mírně kožovité, zelené, mohou být mírně ochlupené, dlouhé 4,9 - 15,5cm, široké 2,4 - 8,5cm, báze je široce klínovitá až zakulacená, spodní strana je světlejší, ochlupená, žilnatinu tvoří 8 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm; květenstvím je přisedlý nebo stopkatý 9 - 19tkvětý okolík, vlastní květy mají kališní lístky délky 1 - 1,6mm, šířky 0,7 - 1mm a korunní lístky jsou krátce nehetnaté; plody mají 7mm stopku