

# Oreorhamnus

čeleď: Rhamnaceae

Existuje pouze 1 druh.

## Oreorhamnus serrulatus (Řešetlák bornejský)

synonyma: *Frangula borneensis*, *Rhamnus borneensis*

oblasti: Borneo, Malajsie, Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu a v Malajsii v podobě stromu s malou korunou. Dorůstá výšky do 15m při průměru kmene 20cm. Mladé části jsou ochlupené. Borka je hladká, červená až hnědě červená. Listy jsou kopinatě eliptické až obvejčité, zakulacené, zašpičatělé nebo špičaté, mírně podvinuté, mohou být drobně pilovité, lesklé, až téměř kožovité, dlouhé 7,5 - 14cm, široké 3 - 5,5cm, báze je špičatá, spodní strana ochlupená a žilnatinu tvoří 7 - 11 párů žilek. Květenstvím je úžlabní svazeček nebo krátce stopkatý vrcholík, vlastní květy mají 4 - 7mm stopku, průměr 4 - 5mm, kališní lístky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé i široké 1,5 - 2mm, korunní lístky nehetnaté, 2laločné a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem je červená kulovitá až obvejčítá peckovice obsahující eliptická až válcovitá semena.

<https://www.rostliny.net/>