

Afrohybanthus

čeleď: Violaceae

Roste v tropické a jižní Africe, Madagaskaru, tropické Asii a Austrálii jako bylina, polokeř i keř. Dorůstá výšky 0,1 - 3m. Povrch může být ochlupený. Palisty mohou být opadavé, čárkovité až kopinaté, špičaté a dlouhé 1,5 - 6mm. Listy jsou střídavé, občas ve svazečcích, přisedlé nebo téměř přisedlé, čárkovité až obvejčité, mohou být zubaté, dlouhé 0,5 - 8cm, široké 0,1 - 1,8cm a báze je klínovitá. Kvete samostatnými úžlabními 5tičetnými květy, kališní lístky jsou uprostřed ochlupené, 3 - 7mižilné, horní 3 kopinaté, korunní lístky jsou bílé, žluté, růžové nebo růžově fialové, horní pár je vejčitě kopinatý, 3 - 5tižilný, postranní jsou srpovité, spodní je nehetnatý a zpravidla tupý. Plodem je zpravidla holá tobolka obsahující (6 -) 9 - 15 (i 18) světle žlutých úzce vejčitých až eliptických semen.

Afrohybanthus aurantiacus

synonyma: *Hybanthus aurantiacus*, *Ionidium aurantiacum*

oblasti: Jižní Austrálie, Queensland, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě kompaktního keře. Dorůstá výšky do 60cm. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích, čárkovité až kopinaté, zpravidla pilovité, kožovité a dlouhé 1 - 4cm. Kvete samostatnými květy, kališní lístky jsou kopinaté, špičaté, ochlupené, zelené, dlouhé 3 - 6mm, pření korunní lístky jsou oranžové až žluté, dlouhé 0,7 - 1,5cm, postranní vnějšího páru úzce podlouhlé a u vnitřního kopinatě srpovité. Plodem je tobolka délky 5 - 9mm a obsahuje 5 - 10 vejčitě eliptických semen délky 2 - 3mm.

Afrohybanthus buxifolius

synonyma: *Hybanthus buxifolius*, *Ionidium buxifolium*, *Solea buxifolia*, *Viola buxifolia*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Afrohybanthus caffer

synonyma: *Calceolaria caffra*, *Hybanthus caffer*, *Ionidium caffrum*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Afrohybanthus danguyanus

synonyma: *Hybanthus danguyanus*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Afrohybanthus decaryanus

synonyma: *Hybanthus decaryanus*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Afrohybanthus densifolius

synonyma: *Hybanthus densifolius*

oblasti: Botswana, Jihoafrická Republika (JAR), Namibie

Roste v Botswaně, JAR a Namibii.

Afrohybanthus enneaspermus

synonyma: *Alsodeia socotrana*, *Calceolaria enneasperma*, *Calceolaria thymifolia*, *Hybanthus enneaspermus*, *Hybanthus enneaspermus f. angustifolius*, *Hybanthus enneaspermus f. flavus*, *Hybanthus enneaspermus f. pubescens*, *Hybanthus enneaspermus var. aurantiacus*, *Hybanthus enneaspermus var. banksianus*, *Hybanthus enneaspermus var. communis*, *Hybanthus enneaspermus var. densifolius*, *Hybanthus enneaspermus var. diversifolius*, *Hybanthus fritzscheanus*, *Hybanthus heterophyllus*, *Hybanthus hildebrandtii*, *Hybanthus hirtus*, *Hybanthus linifolius*, *Hybanthus miniatus*, *Hybanthus mollis*, *Hybanthus nyassensis*, *Hybanthus suffruticosus*, *Hybanthus thesiifolius*, *Hybanthus thymifolius*, *Hybanthus zippelii*

oblasti: Arabský poloostrov, Borneo, Filipíny, Indie, Jáva, Jihoafrická Republika (JAR), Keňa, Madagaskar, Melanésie, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland, Senegal, Sokotra, Srí Lanka, Súdán, Tanzánie, Tchaj-wan, Uganda

Roste v Africe, Arabském poloostrově, Madagaskaru, Indii, Srí Lance, Indonésii, Tchaj-wanu, Nové Guineji a Austrálii jako trvalka (i z části dřevnatějící). Stonky jsou poléhavé nebo vystoupavé, v mládí hranaté a dlouhé 15 - 60cm. Palisty jsou 3úhlé až šídlovité, dlouhé (0,5 -) 1 - 2 (i 4)mm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, zašpičatělé, zpravidla podvinuté, mohou být pilovité nebo řídce vroubkované, dlouhé 0,5 - 9cm, široké 0,1 - 2,5cm, báze je sbíhavá v řapík délky 5 - 7mm. Kvete samostatnými 5tičetnými květy na 0,4 - 1,3cm stopce, kališní lístky jsou dlouhé do 4mm, horní pár korunních lístků je podlouhlý až čárkovitý, dlouhý 3 - 4mm, spodní pár je dlouhý 4,5 - 5mm a dolní centrální lístek je obdélníkovitý až oblichoběžníkovitý, růžový nebo světle modré fialový s tmavšími červeně fialovými žilkami, dlouhý 5,5 - 7mm a široký 5 - 9mm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *ennaspermus/f. angustifolia/var. banksianus/Ionidium banksianum/Pigea banksiana* - Austrálie, Afrika, Asie, Malajsie; palisty dlouhé do 4mm, listy podvinuté, mohou být ochlupené; korunní lístky růžově fialové až modré
- subsp. *scaber*
- subsp. *stellarioides* - Queensland, Nový Jižní Wales; palisty přitisklé, dlouhé 1mm; listy mají okraje zahnuté k zemi, mohou být ochlupené; korunní lístky světle žluté
- subsp. *vernonii*

Afrohybanthus fasciculatus

synonyma: *Hybanthus fasciculatus*

oblasti: Keňa

Roste v Keni v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Listy jsou ve svazečcích, na mladých větvích střídavě, mírně obvejčité, špičaté nebo tupé, pilovité, drsné, dlouhé 1 - 4cm a široké 0,5 - 1,7cm. Kvete bílými, růžovými nebo oranžovými květy, spodní pysk je dlouhý 1,4 - 2cm a široký 0,8 - 1,1cm. Plodem je úzce vejčitá tobolka délky 0,7 - 1cm.

Afrohybanthus indicus

Afrohybanthus nyassensis

synonyma: *Ionidium nyassense*

oblasti: Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zambie

Roste v Malawi, Mosambiku, Tanzánii a Zambii.

Afrohybanthus pseudodanguyanus

synonyma: *Hybanthus enneaspermus* var. *pseudodanguyanus*

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Afrohybanthus ramosissimus

synonyma: *Hybanthus ramosissimus*, *Ionidium ramosissimum*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Afrohybanthus serratus

synonyma: *Hybanthus enneaspermus* var. *serratus*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Afrohybanthus stellarioides

synonyma: *Hybanthus enneaspermus* subsp. *stellarioides*, *Hybanthus enneaspermus* var. *stellarioides*, *Hybanthus stellarioides*

oblasti: Indie, Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Indii a Austrálii jako jednoletka. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou mírně žlábkovité, pilovité, dlouhé 1 - 8cm a široké 2 - 8mm. Kvete samostatnými oranžovými nebo žlutými květy, spodní korunní lístky je lžičkovitý, horní a postranní jsou úzce podlouhlé a dlouhé 3 - 5mm. Plodem je tobolka délky 5,5 - 7,5mm a obsahuje 5 - 10 semen.

Afrohybanthus travancoricus

synonyma: *Hybanthus travancoricus*, *Ionidium travancoricum*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Afrohybanthus tsavoensis

synonyma: *Hybanthus enneaspermus* var. *tsavoensis*

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Afrohybanthus verbi-divini

synonyma: *Hybanthus enneaspermus* var. *verbi-divini*

oblasti: Indonésie

Roste v Indonésii.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=5384>

<https://www.rostliny.net/>