

# Afrohybanthus enneaspermus

synonyma: *Alsodeia socotrana*, *Calceolaria enneasperma*, *Calceolaria thymifolia*, *Hybanthus enneaspermus*, *Hybanthus enneaspermus* f. *angustifolius*, *Hybanthus enneaspermus* f. *flavus*, *Hybanthus enneaspermus* f. *pubescens*, *Hybanthus enneaspermus* var. *aurantiacus*, *Hybanthus enneaspermus* var. *banksianus*, *Hybanthus enneaspermus* var. *communis*, *Hybanthus enneaspermus* var. *densifolius*, *Hybanthus enneaspermus* var. *diversifolius*, *Hybanthus fritzscheanus*, *Hybanthus heterophyllus*, *Hybanthus hildebrandtii*, *Hybanthus hirtus*, *Hybanthus linifolius*, *Hybanthus miniatus*, *Hybanthus mollis*, *Hybanthus nyassensis*, *Hybanthus suffruticosus*, *Hybanthus thesiifolius*, *Hybanthus thymifolius*, *Hybanthus zippelii*

čeleď: Violaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Borneo, Filipíny, Indie, Jáva, Jihoafrická Republika (JAR), Keňa, Madagaskar, Melanésie, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland, Senegal, Sokotra, Srí Lanka, Súdán, Tanzánie, Tchaj-wan, Uganda

Roste v Africe, Arabském poloostrově, Madagaskaru, Indii, Srí Lance, Indonésii, Tchaj-wanu, Nové Guineji a Austrálii jako trvalka (i z části dřevnatějící). Stonky jsou poléhavé nebo vystoupavé, v mládí hranaté a dlouhé 15 - 60cm. Palisty jsou 3úhlé až šídlovité, dlouhé (0,5 -) 1 - 2 (i 4)mm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, zašpičatělé, zpravidla podvinuté, mohou být pilovité nebo řídce vroubkované, dlouhé 0,5 - 9cm, široké 0,1 - 2,5cm, báze je sbíhavá v řapík délky 5 - 7mm. Kvete samostatnými 5tičetnými květy na 0,4 - 1,3cm stopce, kališní lístky jsou dlouhé do 4mm, horní pár korunních lístků je podlouhlý až čárkovitý, dlouhý 3 - 4mm, spodní pár je dlouhý 4,5 - 5mm a dolní centrální lístek je obdélníkovitý až oblichoběžníkovitý, růžový nebo světle modře fialový s tmavšími červeně fialovými žilkami, dlouhý 5,5 - 7mm a široký 5 - 9mm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *enneaspermus*/f. *angustifolia*/var. *banksianus*/*Ionidium banksianum*/*Pigea banksiana* - Austrálie, Afrika, Asie, Malajsie; palisty dlouhé do 4mm, listy podvinuté, mohou být ochlupené; korunní lístky růžově fialové až modré
- subsp. *scaber*
- subsp. *stellarioides* - Queensland, Nový Jižní Wales; palisty přitisklé, dlouhé 1mm; listy mají okraje zahnuté k zemi, mohou být ochlupené; korunní lístky světle žluté
- subsp. *vernonii*

<https://www.rostliny.net/>