

## Pombalia glabra

synonyma: *Calceolaria botterii*, *Calceolaria elata*, *Calceolaria glabra*, *Calceolaria mocinoana*, *Calceolaria riparia*, *Calceolaria riparia* var. *houstonii*, *Hybanthus attenuatus*, *Hybanthus elatus*, *Hybanthus glaber*, *Ionidium attenuatum*, *Ionidium botterii*, *Ionidium elatum*, *Ionidium parietariifolium*, *Ionidium riparium*, *Ionidium riparium* var. *aestivum*, *Mercurialis glabra*, *Pombalia attenuata*

čeleď: Violaceae

oblasti: Belize, Ekvádor, Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Peru, Salvador, USA

Roste od USA po Jižní Ameriku v podobě vzpřímeného zpravidla bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Palisty jsou úzce kopinaté a dlouhé 1 - 3mm. Listy jsou střídavé, zpravidla obkopinaté, zašpičatělé, vroubkované, mohou být drobně ochlupené, dlouhé 7 - 15cm, báze je protáhlá a řapíky jsou krátké. Květy mají kališní lístky úzce kopinaté, dlouhé 4mm, korunní lístky jsou bílé a nejspodnější má délku 1cm. Plodem je vejčitá špičatá nebo zašpičatělá tobolka délky 1 - 1,2cm a obsahuje okrová nebo hnědá prakticky kulatá lesklá semena.

<https://www.rostliny.net/>