

Parthenium hysterophorus

synonyma: *Argyrochaeta bipinnatifida*, *Argyrochaeta parviflora*, *Echetosis pentasperma*, *Parthenium bipinnatifidum*, *Parthenium glomeratum*, *P. var. hysterophorus*, *Parthenium lobatum*, *Parthenium pinnatifidum*, *Villanova bipinnatifida*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Austrálie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Jihoafrická Republika (JAR), Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pákistán, Pennsylvania, Texas, Virginie

Roste v Severní i Jižní Americe jako jednoletka a stala se invazivní i v jiných částech světa. Dorůstá výšky 28 - 80cm. Stonek je větvený, zelený a ochlupený. Listy jsou střídavé, peřeně laločnaté, dlouhé 1,5 - 11cm, široké 1 - 6cm, řapíky dlouhé 1 - 4cm, laloky jsou čárkovité až kopinaté dlouhé 1 - 3cm, široké 3 - 5mm. Květenstvím je 1/2kulatý až zvonkovitý úbor v latě, průměru 3 - 6mm, zákrov je 2řadý, vnějších 5 zákrovních lístků jsou vejčitě kopinaté, špičaté, dlouhé 2,5mm, široké 1,4 - 1,6mm, vnitřní jsou zelené, vejčitě kulaté, dlouhé i široké 1,5 - 2mm, okvětních lístků je 5, jsou bílé, dlouhé 2,5 - 3mm, terčových květů je 20 - 25cm, jsou bílé nebo béžové, dlouhé 2,3 - 2,5mm a koruna má 5 špičatých laloků. Plodem je obvejčitá až hruškovitá zpravidla zploštělá nažka délky 1,5 - 3,5mm s chmýrem.

<https://www.rostliny.net/>