

Sphagneticola

synonyma: Complaya, Thelechitonie

čeleď: Asteraceae

Roste v tropické Americe a Asii jako vystoupavá trvalka. Stonek dokáže v kolénkách znovu zakořenit. Listy jsou jednoduché, vstřícné a max. krátce řapíkaté. Květenství je vrcholové, tvořené 1 i více úbory na dlouhé stopce, zákrov je 2 (i 3)řadý, okvětní lístky jsou žluté nebo oranžové, terčové jsou oboupolohové, žluté nebo oranžové. Plodem je černá nažka s chmýrem. Nejznámějším druhem je *S. trilobata*.

Sphagneticola brachycarpa

synonyma: *Aspilia callosa*, *Seruneum brachycarpum*, *Stemmodontia brachycarpa*, *Thelechitonie brachycarpa*, *Thelechitonie muricata*, *Wedelia brachycarpa*, *Wedelia brasiliensis var. villosa*, *Wedelia callosa*, *Wedelia paludosa var. villosa*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Guyana, Paraguay, Peru, Venezuela

Roste v Guyaně, Venezuele, Brazílii, Paraguayi, Argentině, Peru a Bolívii.

Sphagneticola calendulacea

synonyma: *Complaya chinensis*, *Jaegeria calendulacea*, *Seruneum calendulaceum*, *Solidago chinensis*, *Thelechitonie chinensis*, *Verbesina calendulacea*, *Wedelia calendulacea*, *Wedelia linearis*

oblasti: Filipíny, Indie, Indočína, Indonésie, Japonsko, Srí Lanka, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Indii, Srí Lance, Indočíně, Indonésii a Filipínách.

Sphagneticola gracilis

synonyma: *Complaya gracilis*, *Seruneum gracile*, *Thelechitonie gracilis*, *Verbesina gracilis*, *Wedelia gracilis*, *Wedelia gracilis f. gracilis*

oblasti: Hispaniola, Jamajka, Kuba, Portoriko

Roste na Portoriku, Kubě, Hispaniole, Jamajce a Antigue jako trvalka.

Sphagneticola trilobata (Wedelie trojlaločná)

synonyma: *Acmella brasiliensis*, *Acmella spilanthoides*, *Buphthalmum procumbens*, *Buphthalmum repens*, *Buphthalmum strigosum*, *Complaya trilobata*, *Polymnia carnosa*, *Polymnia carnosa var. carnosa*, *Polymnia crenata*, *Seruneum trilobatum*, *Silphium trilobatum*, *S. ulei*, *Stemmodontia carnosa*, *Stemmodontia trilobata*, *Thelechitonie trilobata*, *Verbesina carnosa*, *Verbesina carnosa var. carnosa*, *Verbesina tridentata*, *Wedelia brasiliensis*, *Wedelia brasiliensis var. brasiliensis*, *Wedelia carnosa*, *Wedelia carnosa var. carnosa*, *Wedelia carnosa var. triloba*, *Wedelia crenata*, *Wedelia paludosa*, *Wedelia paludosa var. paludosa*, *Wedelia triloba*, *Wedelia trilobata*, *Wedelia trilobata var. hirtella*

oblasti: Ekvádor, Florida, Guinea, Havajské ostrovy, Indonésie, J Afrika, J Čína, J Mexiko, Kérala,

Louisiana, Portoriko, Sierra Leone, Tchaj-wan, Thajsko, V Afrika, V Austrálie

Roste v Jižní Americe, zavlečená a zpravidla se stala i invazivní v Asii, Austrálii, Oceánii, střední Americe a USA při mangrovech, podél vodních toků, cest a zahrad v kobercových porostech. Dorůstá výšky do 30cm. Stonky jsou dlouhé až 40cm a v uzlinách dokáže znova zakořenit. Listy jsou vstřícné, kopinaté, špičaté, asymetricky hrubě pilovité až téměř laločnaté, dužnaté, tmavě zelené, řídce krátce štětinaté, dlouhé 4 - 9cm, široké 2 - 5cm a spodní strana je světle zelená. Květenstvím je vrcholový úbor na 3 - 10cm stopce, zákrov je zvonkovitý až 1/2kulatý, dlouhý 1cm, listeny kopinaté, tuhé, okvětních lístků je 8 - 13ks, jsou žluté, dlouhé 0,6 - 1,5cm, trubkovité květy mají žlutou korunu délky 4 - 5mm. Plodem je nažka délky 4 - 5mm.

Vyhovuje ji dobře propustná vlhká chudá půda.

Množí se zpravidla vegetativně.

<https://www.rostliny.net/>