

## Sphagneticola trilobata (Wedelia trojlaločná)

synonyma: Acmella brasiliensis, Acmella spilanthoides, Buphthalmum procumbens, Buphthalmum repens, Buphthalmum strigosum, Complaya trilobata, Polymnia carnosa, Polymnia carnosa var. carnosa, Polymnia crenata, Seruneum trilobatum, Silphium trilobatum, Sphagneticola ulei, Stemmodontia carnosa, Stemmodontia trilobata, Thelechitonita trilobata, Verbesina carnosa, Verbesina carnosa var. carnosa, Verbesina tridentata, Wedelia brasiliensis, Wedelia brasiliensis var. brasiliensis, Wedelia carnosa, Wedelia carnosa var. carnosa, Wedelia carnosa var. triloba, Wedelia crenata, Wedelia paludosa, Wedelia paludosa var. paludosa, Wedelia triloba, Wedelia trilobata, Wedelia trilobata var. hirtella

čeleď: Asteraceae

oblasti: Ekvádor, Florida, Guinea, Havajské ostrovy, Indonésie, J Afrika, J Čína, J Mexiko, Kérala, Louisiana, Portoriko, Sierra Leone, Tchaj-wan, Thajsko, V Afrika, V Austrálie

Roste v Jižní Americe, zavlečená a zpravidla se stala i invazivní v Asii, Austrálii, Oceánii, střední Americe a USA při mangrovech, podél vodních toků, cest a zahrad v kobercových porostech. Dorůstá výšky do 30cm. Stonky jsou dlouhé až 40cm a v uzlinách dokáže znova zakořenit. Listy jsou vstřícné, kopinaté, špičaté, asymetricky hrubě pilovité až téměř laločnaté, dužnaté, tmavě zelené, řidce krátce štětinaté, dlouhé 4 - 9cm, široké 2 - 5cm a spodní strana je světle zelená. Květenstvím je vrcholový úbor na 3 - 10cm stopce, zákrov je zvonkovitý až 1/2kulatý, dlouhý 1cm, listeny kopinaté, tuhé, okvětních lístků je 8 - 13ks, jsou žluté, dlouhé 0,6 - 1,5cm, trubkovité květy mají žlutou korunu délky 4 - 5mm. Plodem je nažka délky 4 - 5mm.

Vyhovuje ji dobře propustná vlhká chudá půda.

Množí se zpravidla vegetativně.

<https://www.rostliny.net/>