

Hippocrepis emerus (Podkovka křovitá)

synonyma: Coronilla emerus

čeleď: Fabaceae

oblasti: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Česká republika, Francie, JZ Asie, JZ Rusko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Krym, Kypr, Libanon, Maďarsko, Makedonie, Německo, Norsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko

Roste v jižní Evropě, jihozápadní Asii a severní Africe v podobě opadavého kompaktního keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 1 - 2m. Větve jsou holé. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, tvořené (1 -) 2 - 4 (i 5)ti páry lístků, vlastní lístky jsou obvejčité, zelené, dlouhé 1,2 - 1,6cm a vrcholový je větší. Květenství je hlávkovité, po 2 - 7ks, umístěné v paždí listů na dlouhé stopce, vlastní květy jsou světležluté, dlouhé 1,5 - 2cm a nehet pavézy je 2 - 3x delší kalicha. Plodem je přehýbatý prakticky válcovitý až hranatý zaškrpcovaný lusk délky 5 - 11cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. emeroides (Podkovka křovitá sličná) - hlávky až 11tikvěté, stopky přibližně stejné délky jako list
- subsp. emerus/Coronilla emerus (Podkovka křovitá pravá) - Evropa; výška 1 (i 2)m; hlávky 1 - 5tikvěté, stopky mnohem delší listu

Vyhovují mu řídké lesy a křoviny, zejména na vápenitém základu.

<https://www.rostliny.net/>