

Abutilon abutiloides

synonyma: Abutilon abutiloides, Abutilon americanum, Abutilon crassifolium, Abutilon crassifolium var. tomentosum, Abutilon decarpum, Abutilon dentatum, Abutilon domingense, Abutilon jacquinii, Abutilon lignosum, Abutilon scabrum, Lavatera americana, Sida abutiloides, Sida americana, Sida crassifolia, Sida jacquinii, Sida lignosa, Sida tomentosa, Sida tricuspidata

čeleď: Malvaceae

oblasti: Arizona, Dominikánská Republika, Haiti, Honduras, J Mexiko, Jamajka, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kolumbie, Kuba, Portoriko, S Mexiko, Střední Mexiko, SV Mexiko, SZ Mexiko, Texas, Z Mexiko, Závětrné ostrovy

Roste od Mexika přes Karibik po Kolumbii v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 1,5m. Stonky jsou vzpřímené a ochlupené. Větve jsou hustě hvězdicovitě plstnaté. Palisty jsou dlouhé 6 - 8mm. Listy jsou řapíkaté, široce vejčité, pilovité, oboustranně plstnaté, zašpičatělé, dlouhé 2 - 8 (i 10)cm, báze je srdčitá až uťatá a řapíky bývají kratší čepele. Květy mají vejčité špičaté na bázi uťaté kališní lístky délky 0,9 - 1,2cm, korunní lístky žluté a dlouhé 1cm. Plody mají po 3 semenech délky 3mm.

<https://www.rostliny.net/>