

Cienfuegosia

čeleď: Malvaceae

Roste v Africe, Arabském poloostrově, Madagaskaru, Jižní, střední i Severní Americe jako trvalka, polokeř nebo keř. Kmínky jsou poléhavé, vystoupavé nebo vzpřímené, mohou být ochlupené a zpravidla hranaté. Vytváří palisty. Listy mohou být laločnaté, celokrajné nebo až hrubě pilovité a řapíkaté. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy, listence jsou malé, šídlovité, čárkovité nebo lopatkovité, délky kalicha, kalich je hluboce 5tilaločný, může být ochlupený, laloky zašpičatělé až zakulacené s hrotem, korunních lístků je 5, jsou žluté až prakticky bílé, růžové nebo růžově fialové s tmavší skvrnou na bázi a žláznatě tečkované. Plodem je tobolka s křehkými suchými stěnami a obsahuje ochlupená obkruželovitá semena.

Cienfuegosia affinis

synonyma: *C. affinis* var. *campestris*, *C. affinis* var. *humilis*, *C. phlomidifolia*, *C. phlomidifolia* var. *humilis*, *C. riedelii*, *C. sulphurea*, *Fugosia affinis*, *Fugosia campestris*, *Fugosia guianensis*, *Fugosia phlomidifolia*, *Fugosia retusa*, *Fugosia sulphurea*, *Hibiscus affinis*, *Hibiscus campestris*, *Hibiscus hilairii*, *Hibiscus phlomidifolius*, *Hibiscus sulphureus*, *Sida angusturensis*

oblasti: Brazílie, Kolumbie, Venezuela

Roste ve Venezuele, Kolumbii a Brazílii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky i více než 0,3 - 1,8m. Kmínky jsou ochlupené. Palisty jsou záhy opadavé, nitkovité a dlouhé 0,3 - 1cm. Listy jsou vejčité až eliptické, oboustranně ochlupené, dlouhé 3 - 12cm, široké 1,5 - 6cm a řapíky jsou dlouhé 0,1 - 1,5cm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy na 1 - 8cm stopce, zákrovních listů je 8 - 10, jsou úzce kopinaté až mírně lopatkovité, tečkované, dlouhé 0,8 - 2,2cm, kalich je tečkovaný, ochlupený, dlouhý 1 - 2,5cm, laloky 3žebřé, korunní lístky jsou žluté, na nehtu s hnědou skvrnou a dlouhé 2,5 - 5cm. Plodem je 3 - 4pouzdré tečkované vejčité ochlupené tobolky délky 1 - 1,5cm a obsahují obkruželovitá až prakticky kulatá semena délky 2 - 3mm.

Cienfuegosia angustifolia

Cienfuegosia argentina

synonyma: *Fugosia argentina*, *Hibiscus argentinus*

Cienfuegosia conciliata

Cienfuegosia digitata

synonyma: *C. junciformis*, *C. tuberculata*, *Fugosia digitata*, *Hibiscus cavanillesii*

Cienfuegosia drummondii

synonyma: *C. sulfurea* f. *intermedia*, *C. sulfurea* var. *drummondii*, *C. sulfurea* var. *glabra*, *C. sulfurea* var. *major*, *C. sulphurea* var. *drummondii*, *C. sulphurea* var. *glabra*, *Elidurandia texana*, *Fugosia drummondii*, *Fugosia pulverulenta*, *Hibiscus drummondii*, *Hibiscus elliotii*, *Hibiscus pinonianus* var. *drummondii*, *Hibiscus pulverulentus*

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay, Texas

Roste v Argentině, Paraguayi, Brazílii a USA v podobě byliny nebo polokeře. Kmínky jsou poléhavé až vystoupavé, hranaté, drobně tečkované a mohou být ochlupené. Palisty jsou opadavé, šídlovité nebo kopinaté, špičaté až zašpičatělé, tečkované, dlouhé 1 - 8mm a široké 0,5 - 1mm. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté, občas mírně 3laločné, hrubě pilovité až zoubkované a kožovité. Kvete na 2 - 11cm stopce, mají 8 - 10 kopinatých až lopatkovitých špičatých až zašpičatělých občas ochlupených zákrovních listenů délky 0,6 - 1,4cm, kalich může být drobně ochlupený, dlouhý 1 - 2cm, laloky kopinaté, špičaté až zašpičatělé, se 3mi žilkami, občas rozeklané na 2 - 3 zuby, korunní lístky jsou žluté, zpravidla s tmavě červenou skvrnou na bázi a dlouhé 1,5 - 3,5cm. Plodem je drobně tečkovaná obvejčitá tupá (i se zobákem) tobolka délky 0,8 - 1,4cm a obsahuje obkruželovitá hnědě žlutá ochlupená semena délky 3 - 4mm.

Cienfuegosia gerrardii

synonyma: Bupariti rehmannii, Fugosia gerrardii, Thespesia rehmannii

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik, Svazijsko

Roste v JAR, Svazijsku a Mosambiku v podobě keře. Kmínky jsou řídké, vzpřímené, tečkované, plstnaté a mohou být mírně žebrované. Palisty jsou vytrvalé, eliptické až podlouhlé, tupé, mohou být ochlupené, dlouhé 1 - 2cm a široké 3 - 8mm. Listy jsou srdčité, špičaté, mohou být mírně 3 - 5laločné, mohou být řídce ochlupené, laloky zakulacené a řapíkaté. Kvete na 0,5 - 1,5cm stopce, mají 9 šídlovitých tečkovaných zákrovních listenů délky 1 - 3 (i 8)mm, kalich může být ochlupený, dlouhý 1 - 1,5cm, laloky bývají 3žebřé, 3úhlé, špičaté (i zašpičatělé, dlouhé 4 - 7mm, korunní lístky jsou žluté s malou tmavě červenou skvrnou na nehtu a dlouhé 2 - 3,5cm. Plodem je kulovitá až obvejčitá 3pouzdrá ochlupená tobolka délky 1 - 1,5cm se zobákem a obsahuje eliptická ochlupená hnědá semena délky 8mm a šířky 5mm.

Cienfuegosia hassleriana

synonyma: C. argentina f. escholtzioides, C. argentina var. hassleriana, C. escholtzioides

Cienfuegosia heteroclada

synonyma: Fugosia heteroclada

oblasti: Ghana, Nigérie

Roste v Nigérii a Ghaně v podobě dvoudomého zakrnělého polokeře. Kmínky jsou žebnaté. Palisty jsou dlouhé 2 - 5mm. Listy jsou eliptické až obvejčité, občas na vrcholu 2 - 3laločné nebo 2 - 5tízubé, se 3 - 5ti žilkami a řapíky jsou žlábkovité. Květenství je tečkované, hranaté, zákrovní listeny nestejně, zpravidla ve 3ks, 3úhlé, občas dřípené nebo 2 - 3dílné, dlouhé 4 - 5mm, široké 2mm, kalich nálevkovitý až zvonkovitý, tečkovaný, dlouhý 0,9 - 1,5cm, laloky občas narůžověle fialové a korunní lístky dlouhé 2 - 3cm. Plodem je tobolka délky 1,8cm, šířky 1cm a obsahuje ochlupená semena délky 1cm.

Cienfuegosia heterophylla

synonyma: C. heterophylla var. cuneata, Fugosia cuneata, Fugosia heterophylla, Hibiscus redoutei, Redoutea heterophylla

oblasti: Karibik

Roste v Karibiku v podobě polokeře nebo keře.

Cienfuegosia hildebrandtii

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik, Svazijsko, Transvaal

Roste v JAR, Svazijsku a Mosambiku v podobě malého vzpřímeného zpravidla ochlupeného keře. Palisty jsou ouškovitě objímavé, zašpičatělé, asymetrické, na okraji ochlupené, dlouhé 0,6 - 1 cm a široké 3 - 5 mm. Listy jsou širší než delší, klínovité, vějířovité, mohou být mírně laločnaté, asymetricky zubaté, 3žilné, spodní strana může být drobně ochlupená a řapíky mají 1/3 délku čepele. Kvete samostatnými (i po více ks) květy na stopkách délky řapíků, zákrovní listeny dlouhé 1 - 3 mm, střední bývá delší, kalich je žebernatý, může být ochlupený, dlouhý 0,7 - 1 cm, laloky mělké, 3žebřé, zakulacené s hrotem, korunní lístky žluté s velkou tmavě červenou skvrnou na nehtu a dlouhé 3 - 4 cm. Plodem je vejčitá až obvejčitá drobně tečkovaná občas ochlupená 3 - 4pouzdrá tobolka délky 1 - 1,4 cm a obsahuje obkruželovitá ochlupená červeně hnědá až špinavě béžová semena délky 5 - 6 mm.

Cienfuegosia hispida

Cienfuegosia hitchcockii

synonyma: *Hibiscus hitchcockii*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky do 2 m. Povrch je v mládí ochlupený až plstnatý. Palisty jsou úzce šídlovité, dlouze vytrvalé a dlouhé 6 - 9 mm. Listy jsou široce vejčité až prakticky kulaté, široce špičaté, asymetricky mělce vroubkované, mělce 3 - 5tilaločné, dlouhé 5 - 11 cm, široké 4,5 - 11 cm, laloky široké, zakulacené nebo široce 3úhlé, báze uťatá až široce srdčitá, spodní strana plstnatá a řapíky jsou dlouhé 1,8 - 4 cm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 3,5 - 9,5 cm stopce, mají 8 - 9 lopatkovitě vejčitých špičatých až zašpičatělých mírně 5tižilných zákrovních listenů délky 1,2 - 1,8 cm, šířky 6 - 9 mm, kalich je hluboce rozeklaný na úzce 3úhlé špičaté až zašpičatělé laloky, dlouhý 1,6 - 2,2 (za plodu až 2,6) cm, koruna je široce nálevkovitá, dlouhá 4,5 - 7 cm, korunní lístky se překrývají, jsou růžové a drobně červeně tečkované. Plodem je načervenalá až tmavě hnědá vejčitá tobolka délky (1,8 -) 2 - 2,5 cm s hrotem a obsahuje obkruželovitě ledvinitá ochlupená semena délky 4,5 - 5 mm.

Cienfuegosia humbertiana

synonyma: *Hibiscus humbertianus*

Cienfuegosia integrifolia

synonyma: *C. subprostrata* var. *vera*, *C. sulfurea* var. *integrifolia*, *C. sulphurea* var. *integrifolia*

Cienfuegosia intermedia

Cienfuegosia lanceolata

synonyma: *C. cuyabensis*, *C. glabrifolia*, *Fugosia lanceolata*, *Hibiscus glabrifolius*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii v podobě poléhavého až vystoupavého polokeře. Kmínky jsou bohatě tečkované, v mládí mírně žebnaté a zelenavé. Palisty jsou čárkovité a ochlupené. Listy jsou úzce eliptické, špičaté, tečkované, dlouhé 3 - 6cm, široké 1 - 1,7cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 6mm. Květy mají 1 - 3cm stopku, 9 - 10 čárkovitá až mírně lopatkovitých špičatých zákrovních listenů délky 0,7 - 1cm, kalich je dlouhý 1 - 1,2cm, laloky špičaté, 3žebné, korunní lístky průsvitně tečkované, žluté s hnědou skvrnou se žlutými paprsky a dlouhé 3 - 3,5cm. Plodem je hrbolatá vejčitá tobolka délky 0,8 - 1cm a obsahuje ochlupená semena.

Cienfuegosia rosei

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě vzpřímeného polokeře. Dorůstá výšky 1m. Kmínky jsou 5tíhranné a mohou být drobně ochlupené. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 4 - 7mm. Listy jsou úzce kopinaté, kosočtvercovitě vejčité až široce 3laločné, zpravidla hrořité, mohou být oboustranně ochlupené, dlouhé 3 - 9cm, báze uťatá a řapíky mají délku 1/2 - 1/1 čepele. Kvetou samostatnými úžlabními květy na 1,5 - 9,5cm stopce, mají 9 - 10 zpravidla nitkovitých zákrovních listenů délky 0,3 - 1,2cm, kalich je dlouhý 1,2 - 2,5cm, hluboce rozeklaný, laloky 3žebné, korunní lístky žluté s výraznou hnědou tečkou na bázi se žlutými pruhy a dlouhé 2 - 3,5cm. Plodem je vejčitá 3pouzdrá tobolka délky 1 - 1,3cm a obsahuje ochlupená semena délky 4 - 5mm.

Cienfuegosia saraviae

Cienfuegosia schulzii

Cienfuegosia subprostrata

Cienfuegosia subternata

synonyma: *C. heterophylla* subsp. *subternata*

Cienfuegosia sulfurea

synonyma: *C. drummondii* var. *pubescens*, *Fugosia sulfurea*, *Hibiscus jussieui*

Cienfuegosia sulphurea

Cienfuegosia tripartita

synonyma: *Fugosia tripartita*, *Hibiscus cuneatus*, *Hibiscus tripartitus*, *Redoutea tripartita*

Cienfuegosia ulmifolia

Cienfuegosia welshii

synonyma: *C. chiarugii*, *C. hearnii*, *C. somaliana*, *Hibiscus welshii*

oblasti: Etiopie, Jemen, Omán, Somálsko

Roste v Somálsku, Etiopii, Jemenu a Ománu v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 1m. Stonky jsou tečkované a mohou být ochlupené. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 1 - 4mm. Listy jsou střídavé, ledvinité až klínovitě obvejčité, mohou být až 3sečné, vroubkované až zubaté, občas zvlněné, dlouhé 0,5 - 5cm, široké 0,5 - 6cm, řapíky jsou drsné a dlouhé 0,5 - 7cm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy na 0,3 - 6 (i 7)cm stopce, listenů bývá 9, jsou šídlovité, dlouhé 1 - 2 (i 5)mm, kalich je dlouhý 0,6 - 1,2cm, s 5ti zuby, může být ochlupený, zpravidla 2laločný, korunní lístky jsou bledě žluté s tmavě červeným až hnědě červeným středem a dlouhé 1,5 - 3cm. Plodem je eliptická až kulovitá zpravidla ochlupená 3 - 4pouzdrá řídce ochlupená tečkovaná tobolka délky (1 -) 1,2 - 1,5 (i 3)cm, šířky 0,7 - 1cm a obsahuje ochlupená semena délky 4 - 5mm.

Vyhovují ji kamenitá místa a příležitostná koryta toků.

Cienfuegosia yucatanensis

oblasti: Florida, Kuba, Yucatán

Roste v Mexiku, Kubě, Bahamských ostrovech a USA v podobě polokeře nebo byliny. Kmínky jsou 5tíhranné. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 1 - 2mm. Listy jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 4cm, šířky 4 - 10x menší, na mladých exemplářích ale více širší a řapíky mají 1/4 - 1/2 délku čepele. Kvete úžlabními květy na 1 - 5cm stopce, mají 6 - 9 šídlovitých zákrovních listenů délky 0,5 - 2mm, kalich je dlouhý 0,8 - 1,2cm, hluboce rozeklaný, drobně žebnatý, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 1 - 2cm a na spodní straně drobně ochlupené. Plodem je vejčitá tobolka délky 6 - 8mm a obsahuje ochlupená semena délky 2 - 3mm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1860>

<https://botany.cz/cs/cienfuegosia-welshii/>

<https://www.rostliny.net/>