

Cienfuegosia drummondii

synonyma: Cienfuegosia sulfurea f. intermedia, Cienfuegosia sulfurea var. drummondii, Cienfuegosia sulfurea var. glabra, Cienfuegosia sulfurea var. major, Cienfuegosia sulphurea var. drummondii, Cienfuegosia sulphurea var. glabra, Elidurandia texana, Fugosia drummondii, Fugosia pulverulenta, Hibiscus drummondii, Hibiscus elliottii, Hibiscus pinonianus var. drummondii, Hibiscus pulverulentus

čeleď: Malvaceae

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay, Texas

Roste v Argentině, Paraguayi, Brazílii a USA v podobě bylinky nebo polokeře. Kmínky jsou poléhavé až vystoupavé, hranaté, drobně tečkované a mohou být ochlupené. Palisty jsou opadavé, šídlovité nebo kopinaté, špičaté až zašpičatělé, tečkované, dlouhé 1 - 8mm a široké 0,5 - 1mm. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté, občas mírně 3laločné, hrubě pilovité až zoubkované a kožovité. Kvete na 2 - 11cm stopce, mají 8 - 10 kopinatých až lopatkovitých špičatých až zašpičatělých občas ochlupených zákravných listenů délky 0,6 - 1,4cm, kalich může být drobně ochlupený, dlouhý 1 - 2cm, laloky kopinaté, špičaté až zašpičatělé, se 3mi žilkami, občas rozeklané na 2 - 3 zuby, korunní lístky jsou žluté, zpravidla s tmavě červenou skvrnou na bázi a dlouhé 1,5 - 3,5cm. Plodem je drobně tečkovaná obvejčitá tupá (i se zobákem) tobolka délky 0,8 - 1,4cm a obsahuje obkuželovitá hnědě žlutá ochlupená semena délky 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>