

Macleania rupestris

synonyma: Macleania alpicola, Macleania attenuata, Macleania costaricensis, Macleania elliptica, Macleania euryphylla, Macleania glabra, Macleania irazuensis, Macleania nitida, Macleania punctata var. puberula, Macleania racemosa, Macleania reducta, Macleania sodiroi, Macleania trianae, Macleania turrialbana, Psammisia alpicola, Psammisia costaricensis, Psammisia glabra, Psammisia nitida, Psammisia rupestris, Thibaudia nitida, Thibaudia rupestris

čeleď: Ericaceae

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kostarika, Nikaragua, Panama, Peru, S Andy, Venezuela

Roste od střední Ameriky po Andy Venezuely a Peru v podobě stálezeleného pozemního nebo epifytického keře nebo liány (i malého stromu). Dorůstá výšky 0,6 - 2m. Kmínky mohou být ochlupené. Větve jsou dlouhé až 6m. Listy jsou střídavé, eliptické nebo vejčité, tupé nebo zašpičatělé, nepatrн vroubkované, kožovité, dlouhé (2 -) 4 - 8 (i 15)cm, široké (1,2 -) 2 - 5 (i 7,5)cm, báze zakulacená nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,1cm. Květenstvím je (4 -) 10 - 20ti květý hrozen délky (0,5 -) 1 - 1,5 (i 8)cm, listeny jsou drobné, zpravidla ochlupené, vlastní květy mají (0,7 -) 1 - 2,4cm stopku, kalich je dlouhý 5 - 7mm, krátce cípatý, koruna je 5ti četná, trubkovitá až dlouze baňkovitá, růžově červená, na vrcholku bělavá nebo nažloutlá a dlouhá (1,1 -) 1,3 - 1,9 (i 2,4)cm. Plodem je jedlá sladká kulovitá černě modrá bobule průměru 1,2 - 1,5cm.

Vyhovují mu vlhké horské lesy.

<https://www.rostliny.net/>