

Baphia (Kápatka)

čeleď: Fabaceae

Roste v Africe, 1 druh na Madagaskaru, v podobě vzpřímeného nebo šplhavého keře či liány (s délkou až 80m) nebo (i stromu). Větve mohou být ochlupené. Palisty bývají záhy opadavé. Listy jsou střídavé, zašpičatělé, kožovité až papírovité, celokrajné, řapíkaté a mohou být ochlupené.

Květenstvím je řídký úžlabní nebo vrcholový hrozen, vlastní květy bývají aromatické, stopkaté, s 2ma listenci, kalich je k bázi rozeklaný, toulcovitý nebo 2laločný, na vrcholu zpravidla se 2 - 5ti zuby, pavéza bývá nehetnatá, občas přisedlá, široce vejčitá až prakticky kulatá (i eliptická), bílá (i béžová, narůžověle červená nebo narůžověle fialová) se žlutou nebo oranžovou skvrnou na bázi, občas ochlupená, křídla bílá, mohou být i narůžověle fialová nebo narůžověle červená a člunek podobné barvy. Plodem je úzce podlouhlý až obkopynatý (i kosočtvercový) při vrcholu výrazně zahnutý zpravidla dřevnatý hnědý nebo tmavě růžově fialový lusk obsahující 1 - 5 čočkovitých bledě hnědých až prakticky černých semen.

Baphia abyssinica

oblasti: Etiopie, Súdán

Roste v Etiopii a Súdánu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m. Listy jsou vejčité nebo eliptické, zašpičatělé, mohou být kožovité, dlouhé 2,5 - 11cm, široké 1,2 - 5,1cm, báze je zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 3cm. Kvete samostatnými květy nebo v několikakvětých svazečcích na 0,5 - 1,2cm stopce, listence jsou vstřícné, vejčité, ochlupené, dlouhé 0,7 - 1,2mm, široké 1,2mm, kalich lopatkovitý, ochlupený, 2zubý, dlouhý 5 - 6mm, pavéza dlouhá 0,9 - 1,15cm, široká 0,9 - 1cm a křídla i člunek mají na bázi kapsu. Plodem je hnědý lusk délky 3,2 - 5cm, šířky 1,2 - 1,8cm a obsahuje hnědá semena.

Baphia angolensis

synonyma: *B. verschuereni*

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Angole a Demokratické Republice Kongo v podobě stromu. Dorůstá výšky do 18m. Listy jsou vejčité, zašpičatělé v délce 0,4 - 2,1cm, mohou být prakticky kožovité, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 4,2cm, báze je zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3,5 - 6mm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy na 1,2 - 2,6cm stopce, listence jsou vstřícné, 1/2 - 1/1kulaté, na okraji ochlupené, dlouhé 1,2 - 1,8mm, široké 2 - 2,5mm, kalich toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,2 - 1,3cm, pavéza dlouhá 1,2 - 1,3cm, široká 1,1 - 1,2cm a křídla s člunek mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý na vrcholu výrazně zakřivený hnědý lusk délky 6 - 8cm a šířky 1,2cm.

Baphia arenicola

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Baphia aurivellerea

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo a Angole v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou plstnaté až ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, špičaté nebo zašpičaté, prakticky kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 2,5 - 7cm, široké 1 - 2,5cm, báze je klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,2cm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky 1,5 - 2,7cm, vlastní květy mají 0,3 - 1cm stopku, listence vstřícné, vejčité, tupé, plstnaté, dlouhé 1,3 - 1,5mm, široké 1,4 - 2mm, kalich 2laločný, ochlupený, dlouhý 2 - 7mm, pavéza dlouhá 0,9 - 1cm, široká 0,95 - 1cm a křídla i člunek mají na bázi kapsu. Plodem je plstnatý lusk délky 4,8 - 7,2cm, šířky 1 - 1,5cm a obsahuje 1 - 2 hnědá semena.

Baphia bequaertii

synonyma: *B. ringoetii*

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Rovnicková Guinea, Zambie

Roste v Rovnickové Guineji, Demokratické Republice Kongo, Zairu, Zambii a Angole v podobě bohatě větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou zprvu plstnaté. Listy jsou obvejčité až prakticky kulaté nebo mírně 4hranné, tupé, zakulacené nebo vykrojené (i s hrotem), kožovité, zprvu ochlupené, dlouhé 5 - 18cm, široké 3,2 - 14,5cm, báze je zakulacená až srdčitá, spodní strana plstnatá, žilnatinu tvoří 4 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 12cm. Květenstvím je úžlabní svazeček, vlastní květy mají 1,8 - 4,2cm stopku, listence vstřícné, úzce 3úhlé, plstnaté, dlouhé 4 - 7mm, široké 1,5 - 2mm, kalich toulcovitý, zprvu plstnatý, dlouhý 1 - 1,8cm, pavéza dlouhá 1,7 - 2,2cm, široká 1,9 - 2,2cm a člunek je z části ochlupený. Plodem je v mládí plstnatý lusk délky 9 - 22,5cm, šířky 1,5 - 3,8cm a obsahuje 1 - 3 tmavě hnědá až prakticky černá semena délky 1,5 - 2,2cm a šířky 1,2 - 2cm.

Baphia bergeri

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, tupé nebo špičaté, na obou koncích ochlupené, dlouhé 9,1 - 20cm, široké 4,3 - 9,2cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 13 párů žilek, řapíky jsou rýhované a dlouhé 2,2 - 12,8cm. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní plstnatý hrozen délky 2,5 - 20,5cm, vlastní květy mají 0,6 - 1,4cm stopku, listence vstřícné, 3úhle vejčité, plstnaté, dlouhé 3mm, široké 1mm, kalich 2laločný se 2 - 3mi zuby, ochlupený, dlouhý 1,1 - 1,3cm, pavéza je plstnatá, dlouhá 1,4 - 1,5cm, široká 1,5cm, křídla s člunkem jsou na bázi svaštělá a plstnaté. Plodem je lusk.

Baphia brachybotrys

synonyma: *B. sublucida*

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun)

Roste v Gabonu, Demokratické Republice Kongo a Angole v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou zprvu ochlupené. Listy jsou podlouhlé, úzce eliptické nebo úzce vejčité, zašpičaté, mohou být kožovité, dlouhé 6 - 7,5cm, široké 2,8 - 3,6cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 8

párů žilek, řapíky jsou rýhované a dlouhé 4 - 6,5mm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy v nepravém plstnatém hroznu, vlastní květy mají 0,5 - 2,2cm stopku, listence vstřícné, prakticky kulaté, na okraji ochlupené, dlouhé 0,8- 1,5mm, široké 2 - 2,5mm, pavéza je dlouhá i široká 1,2 - 1,5cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je lusk.

Baphia buettneri

oblasti: Angola, Gabon (Gabun), Kamerun, Rovníková Guinea

Roste v Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce eliptické až mírně obkopynaté, zašpičatělé v délce do 1,8cm, mohou být kožovité, dlouhé 5 - 16,8cm, široké 2 - 7,5cm, báze je tupá, zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 9mm. Kvete samostatnými květy nebo v chudých úžlabních hroznech, mají 0,75 - 2,3cm stopku, listence vstřícné, prakticky kulaté až ledvinité, dlouhé 1 - 1,3mm, široké 1,8 - 2,1mm, kalich toulcovitý, ochlupený, dlouhý 1 - 1,3cm, pavéza dlouhá 1,1 - 1,75cm, široká 1,1 - 1,6cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je lusk. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. buettneri - Gabon, Angola; listy jsou eliptické až mírně vejčité, řapíky dlouhé 4,5 - 6mm; květenství je zpravidla plstnaté, vlastní květy mají 0,75 - 1,8cm stopku, kalich zprvu ochlupený, pavéza je dlouhá do 1,75cm
- subsp. hylophila/B. hylophila - Kamerun, Rovníková Guinea a Gabon; listy kopinaté, obkopynaté nebo úzce eliptické, řapíky dlouhé 4,5 - 9mm; květenství prakticky holé, květy mají 1,1 - 2,3cm stopku, kalich pouze s chomáčkem na vrcholu, pavéza dlouhá do 1,4cm

Baphia burttii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě bohatě větveného vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, obvejčité nebo vejčité, zašpičatělé, dlouhé 3 - 6,8cm, široké 2 - 3,8cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenstvím je úžlabní ochlupený hrozen nebo nepravá lata délky 2 - 2,5cm, vlastní květy mají 0,3 - 1,6cm stopku, listence jsou z části srostlé, vstřícné, nitkovité, ochlupené, dlouhé 1,5 - 3mm, široké 0,3mm, kalich toulcovitý, zpravidla 2zubý, ochlupený, dlouhý 0,8 - 1cm, pavéza dlouhá 1,3 - 1,7cm, široká 1,3 - 1,6cm a člunek může být na okraji řídce ochlupený. Plodem je podlouhlý tmavě hnědý až růžově fialový lusk délky 9 - 11,5cm a šířky 2,3 - 2,8cm.

Baphia capparidifolia

oblasti: Angola, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Guinea, JZ Madagaskar, Kamerun, Libérie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Rwanda, Sierra Leone, Tanzánie, Uganda, Z Madagaskar, Zambie

Roste na Madagaskaru, jižní a střední Africe v podobě šplhavého či popínavého keře nebo liány. Větve jsou ochlupené. Listy jsou vejčité až kopinaté nebo úzce eliptické, špičaté nebo zašpičatělé,

mohou být prakticky kožovité, lesklé, tmavě zelené, dlouhé 4 - 18cm, široké 2,2 - 7,8cm, báze je zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 15cm. Květenstvím je úžlabní plstnatý hrozen délky 1,7 - 14cm, vlastní květy mají 0,15 - 1,2cm stopku, listence jsou vstřícné, široce vejčité až prakticky kulaté nebo 3úhle vejčitě kopinaté, plstnaté, dlouhé 1,1 - 4,5mm, široké 0,5 - 2,3mm, kalich je 2laločný, plstnatý, dlouhý 3,5 - 8,5mm, pavéza dlouhá 0,55 - 1,2cm, široká 0,5 - 1cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je zprvu ochlupený hnědý lusk délky 3,8 - 7,8cm, šířky 0,6 - 1,5cm, obsahuje 1 - 2 semena délky 1 - 1,3cm a šířky 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bangweolensis* - Demokratická Republika Kongo, Zambie, Tanzánie; větve plstnaté; listy široce vejčité (i kopinaté), tupé, špičaté nebo zašpičatělé (i vykrojené), prakticky kožovité, dlouhé 4 - 9,2cm, široké 2,2 - 5,4cm; hrozny plstnaté, dlouhé 2 - 14cm, listence ochlupené, dlouhé 2 - 4,5mm, široké 1,1 - 2mm, kalich dlouhý 5,5 - 8,5mm, pavéza dlouhá 0,75 - 1,05cm, široká 0,9 - 1,05cm, křídla i člunek dlouhé 0,85 - 1,15cm, široké 3 - 5,1mm; lusky zprvu ochlupené, dlouhé 3,8 - 7,8cm a široké 0,8 - 1,5cm

- subsp. *capparidifolia* - jihozápadní a západní Madagaskar; větve řídce ochlupené až plstnaté; listy vejčité až kopinaté, tupé nebo špičaté, zpravidla kožovité, dlouhé 2,8 - 9,5cm, široké 1,8 - 4,5cm, řapíky dlouhé 0,5 - 3cm; hrozny ochlupené, dlouhé 2 - 5,2cm, listence plstnaté, dlouhé 1,6 - 2mm, kalich dlouhý 3,5 - 6,6mm, pavéza dlouhá 6,5 - 7mm, široká 8,2 - 9mm, křídla s člunkem dlouhé 7 - 8,5mm, široké 3 - 4,5mm; lusky dlouhé 4,5 - 6cm, široké 0,8 - 1cm

- subsp. *multiflora*/B. *albido-lenticellata*/B. *goossensii*/B. *multiflora*/B. *polygalacea*/B. *polygalacea* var. *hepperi*/B. *pynaertii*/B. *zenkeri* - Kamerun, Gabon, Demokratická Republika Kongo, Angola, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzánie; větve ochlupené; listy vejčité, špičaté až zašpičatělé, mohou být prakticky kožovité (i kožovité), dlouhé 5 - 15,2cm, široké 2,5 - 6,3cm, řapíky dlouhé 1,1 - 15cm; hrozny ochlupené, dlouhé 1,7 - 11,5cm, listence ochlupené, dlouhé 1,1 - 2,6mm, široké 0,5 - 1,8mm, kalich dlouhý 4,4 - 8mm, pavéza dlouhá 0,55 - 1,2cm, široká 0,58 - 1,2cm, křídla a člunek dlouhý 0,5 - 1,1cm, široký 2 - 5mm; lusky dlouhé 5,4 - 6,9cm a široké 1 - 1,2cm

- subsp. *polygalacea*/B. *leptobotrys* var. *nigerica*/B. *polygalacea*/B. *Bracteolaria polygalacea*/Carp. *lobia dubia* - Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží Slonoviny, Nigérie a Kamerun; větve řídce ochlupené; listy vejčité (i úzce eliptické), zašpičatělé, dlouhé 5,8 - 18cm, široké 1,6 - 7,8cm, řapíky dlouhé 2 - 7,4cm; hrozny plstnaté, dlouhé 1,5 - 12cm, listence plstnaté, dlouhé 1,1 - 2,6mm, široké 0,5 - 1,8mm, kalich dlouhý 5 - 6,5mm, pavéza dlouhá 0,65 - 1cm, široká 0,55 - 1cm, křídla i člunek dlouhý 0,6 - 1,1cm, široký 3 - 5,5mm; lusky dlouhé 3,7 - 6,8cm a široké 0,6 - 1,2cm

Baphia chrysophylla

synonyma: *B. chrysophylla* subsp. *chrysophylla*, *B. gillettii*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, obvejčité nebo úzce eliptické, zašpičatělé, dlouhé 3 - 11cm, široké 1,5 - 4,8cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,5cm. Květenstvím je plstnatý vrcholový nebo úžlabní hrozen v nepravé latě délky 2 - 11,2cm, vlastní květy mají 3,5 - 9mm stopku, listence jsou vstřícné, úzce kopinaté až podlouhlé, plstnaté, dlouhé 1,5 - 4mm, široké 0,5 - 1mm, kalich toulcovitý, ochlupený, dlouhý 1,2 - 1,6mm, pavéza dlouhá 1,3 - 1,5cm, široká 1 - 1,5cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi. Plodem je lusk. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *chrysophylla* - jihozápadní Demokratická Republika Kongo; listy eliptické až obvejčité, dlouhé 3 - 9cm, široké 1,5 - 4cm, spodní strana ochlupená, řapíky dlouhé 0,4 - 1,4cm; květenství dlouhé 4 - 11,2cm

- subsp. *claessensii*/B. *claessensii* - jihovýchodní Demokratická Republika Kongo; listy úzce eliptické až mírně obvejčité, dlouhé 3 - 11cm, široké 1,8 - 4,8cm, spodní strana zprvu řídce ochlupená, řapíky dlouhé 0,8 - 1,5cm; květenství dlouhé 2 - 7cm

Baphia claessensii

synonyma: *B. chrysophylla* subsp. *claessensii*

Baphia cordifolia

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 14m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou široce vejčité, tupé až zakulacené, kožovité, zprvu ochlupené, dlouhé 7 - 15cm, široké 4,6 - 12cm, báze je srdčitá až prakticky uťatá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek, řapíky jsou rýhované a dlouhé 1,5 - 5,8cm. Květenstvím je nepravá plstnatá lata délky 4,5 - 7cm, vlastní květy mají 0,5 - 1,2cm stopku, listence úzce 3úhlé, plstnaté, dlouhé 1 - 3mm, kalich toulcovitý, zpravidla 2laločný, ochlupený, dlouhý 0,8 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1,6 - 2,6cm, široká 1,8 - 2,5cm a křídla i člunek mají kapsu na bázi. Plodem je dřevnatý křídlatý lusk délky 10,5 - 15cm a šířky 2,5 - 4cm.

Baphia cuspidata

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Rovníková Guinea

Roste v Kamerunu, Rovníkové Guineji a Gabonu v podobě liány. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou vejčité (i eliptické), zašpičatělé, dlouhé 5 - 12,5cm, široké 2,9 - 6cm, báze je tupá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, řapíky jsou rýhované a dlouhé 0,8 - 2,8cm. Květenstvím je úžlabní 1 - 4květý svazeček, vlastní květy mají 0,9 - 1,1cm stopku, listence vstříčné, podlouhlé nebo kopinaté, ochlupené, dlouhé 1,8 - 3mm, široké 0,6 - 1,4mm, kalich toulcovitý, ochlupený, dlouhý 1 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1,5 - 1,8cm, široká 1,5 - 2cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi. Plodem je lusk.

Baphia cymosa

oblasti: Gabon (Gabun)

Roste v Gabonu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou široce eliptické a na spodní straně řídce ochlupené. Kvete bílými květy.

Baphia dewevrei

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo a Angole v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 25m. Větve mohou být v mládí plstnaté. Listy jsou vejčité až obvejčité kopinaté, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 5 - 11,2cm, široké 2,5 - 5,8cm, báze je zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,45 - 1,1cm. Květenstvím je úžlabní 1 - 4květý svazeček, vlastní květy mají 0,45 - 1cm stopku, listence vstříčné, 1/2kulaté, vejčité nebo ledvinité, pohárkovité, okraje ochlupené, dlouhé 1 - 2mm, široké 3 - 4mm, kalich toulcovitý, ochlupený, dlouhý 1 - 1,7cm, pavéza je dlouhá 1,4cm, široká 1,3 - 2cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi. Plodem je podlouhlý až mírně kosočtvercový lusk délky 4 - 11,5cm, šířky 2 - 3cm a obsahuje 1 - 3 hnědá eliptická semena délky 1,6 - 2,2cm a šířky 1,2 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. marceliana/B. marceliana - keř nebo strom; výška do 15m; větve mohou být v mládí řídce ochlupené nebo plstnaté; listy úzce eliptické až vejčité eliptické, zašpičatělé, mohou být kožovité, dlouhé 4,5 - 18cm, široké 2 - 6cm, báze kulatá až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,8cm; květenstvím je až 12tikvětý úžlabní svazeček, vlastní květy mají 0,4 - 1,5cm stopku, listence vstříčné, široce vejčité, pohárkovité, na okraji ochlupené, dlouhé 1,2 - 2mm, široké 2 - 4mm, kalich toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,2 - 1,5cm, pavéza dlouhá 1,3 - 1,7cm, široká 1,5 - 1,8cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu; lusky dřevnaté, hnědé, dlouhé 9,5 - 13cm, široké 2 - 3cm, obsahují 1 - 2 hnědá semena délky 1,3 - 1,7cm a šířky 1 - 1,3cm
- var. marceliana - Demokratická Republika Kongo; řapíky dlouhé 1,2 - 3,8cm; květy mají 1,2 - 3,8cm stopky, listence mohou být řídce ochlupené, kalich na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,2 - 1,5cm, křídla i člunek dlouhé 1,4 - 2cm, semeníky mohou být řídce ochlupené
- var. marquesii/B. marquesii - Angola; řapíky dlouhé 1 - 2,2cm; květy mají 4 - 8mm stopku, listence s kalich drobně ochlupené, kalich dlouhý 1,2 - 1,3cm, křídla a člunek dlouhé 1,3 - 1,5cm, semeníky ochlupené pouze na okraji

- subsp. marquesii

Baphia dewildeana

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Kamerunu a Nigérii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 8m. Větve mohou být plstnaté. Listy jsou podlouhlé, mírně obvejčité nebo vejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 4 - 10cm, široké 1,6 - 3,6cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květy samostatnými nebo párovými úžlabními květy na 1 - 1,5cm stopce, listence jsou vstříčné, široce vejčité až prakticky kulaté, pohárkovité, na okraji ochlupené, dlouhé 1,2 - 1,8mm, široké 2,6 - 3mm, kalich toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,2 - 1,7cm, pavéza dlouhá 1,4 - 2cm, široká 1,3 - 2cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi. Plodem je lusk.

Baphia dubia

synonyma: B. goossensii var. grandifolia

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Rovnicková Guinea

Roste v Rovnickové Guineji a Demokratické Republice Kongo v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí převislé a mohou být ochlupené. Listy jsou úzce

kopinaté až úzce eliptické, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 8 - 16,5cm, široké 2,5 - 6cm, báze je srdčitá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek, řapíky jsou rýhované a dlouhé 0,8 - 1,8cm. Květenstvím je řídkce ochlupený úžlabní hrozen nebo nepravá lata délky 5 - 13,8cm, vlastní květy mají stopku délky 3,5 - 5mm, listence jsou na bázi srostlé, široce vejčité, ochlupené, dlouhé 1,2 - 1,8mm, široké 1,5 - 2,1mm, kalich je 2laločný, ochlupený, dlouhý 7 - 9mm, pavéza je dlouhá 0,8 - 1,2cm, široká 1 - 1,2cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je zprvu ochlupený lusk délky 15 - 18cm, šířky 2,5 - 3cm a obsahuje až 5 semen.

Baphia eriocalyx

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie

Roste v Nigérii, Kamerunu, Gabonu a Demokratické Republice Kongo v podobě rozkladitého keře nebo liány. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou podlouhlé až obvejčité nebo obkopinaté, zakulacené až zašpičatělé, kožovité, dlouhé 7 - 19,5cm, široké 3 - 8,8cm, báze je tupá nebo zakulacená, spodní strana zprvu plstnatá, žilnatinu tvoří 8 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8,5mm. Květenstvím je úžlabní svazeček (i samostatný květ), vlastní květy mají 0,8 - 1,6cm stopku, listence vstřícné, široce vejčité až prakticky kulaté, plstnaté, opadavé, dlouhé 1,8 - 3mm, široké 2 - 3,5mm, kalich toulcovitý, výrazně zahnutý, plstnatý, dlouhý 1,1 - 1,45cm, pavéza dlouhá 1,2 - 1,5cm, široká 1,4 - 2,1cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu.

Baphia gossweileri

oblasti: Angola, Gabon (Gabun)

Roste v Gabonu a Angole v podobě keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, široce eliptické (i obvejčité), zašpičatělé v délce 1cm, mohou být prakticky kožovité, dlouhé 5 - 7cm, široké 3 - 4,5cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Kvete v 1 - 4květých svazečcích na bezlistých větvích podepřený listenem, vlastní květy mají 0,9 - 1,8cm stopku, listence vstřícné, široce vejčité až prakticky kulaté, pohárkovité, ochlupené, dlouhé 1,5 - 1,8mm, široké 2 - 2,5mm, kalich toulcovitý, v horní 1/3 ochlupený, dlouhý 1,4 - 1,5cm, pavéza je dlouhá 1,2 - 1,8cm, široká 1,3 - 2cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý bledě hnědý lusk délky 9 - 11cm, šířky 1,3 - 1,5cm a obsahuje 1 - 2 tmavě hnědá semena.

Baphia heudelotiana

oblasti: Guinea, Senegal, Sierra Leone

Roste v Guinei, Sieře Leoně a Senegalu v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí převislé. Listy jsou úzce kopinaté nebo vejčité, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 7 - 12cm, široké 3 - 5,5cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2cm. Květenstvím je úžlabní ochlupený hrozen délky 2 - 9,2cm, vlastní květy mají 0,5 - 1,2cm stopku, listence na bázi srostlé, vejčité až prakticky kulaté, tupé nebo špičaté, ochlupené, dlouhé 1,6 - 2,5mm, široké 1,6 - 1,8mm, kalich je 2laločný, ochlupený, dlouhý 7 - 9,5mm, pavéza je dlouhá 1 - 1,5cm, široká 1,2 - 1,5cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je lusk délky 3,2 - 4cm a šířky 0,6 - 1cm.

Baphia incerta

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické (i vejčité podlouhlé), zašpičatělé, mohou být prakticky kožovité, dlouhé 5 - 13cm, široké 2,3 - 4,5cm, báze je mírně asymetrická, zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3,5 - 7mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy na 0,7 - 1,5cm stopce, listence jsou vstřícné, široce vejčité až prakticky kulaté, pohárkovité, na okraji ochlupené, dlouhé 1,3 - 2,2mm, široké 1,3 - 4mm, kalich je toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1,1 - 1,4cm, široká 1,2 - 1,4cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je úzce obvejčitý nebo obkopinatý hnědý lusk délky 7 - 15cm, šířky 1,4 - 3cm, obsahuje 2 - 4 hnědá semena délky i šířky 0,8 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. incerta - jihozápadní a střední Demokratická Republika Kongo; větve v mládí zprvu ochlupené; listy dlouhé 6 - 13cm, široké 2,3 - 4cm, báze zpravidla asymetrická; květy mají 0,7 - 1,5cm stopku, listence široce vejčité až prakticky kulaté, dlouhé 1,3 - 2,3mm a široké 2 - 4mm
- subsp. lebrunii/B. lebrunii - východní Demokratická Republika Kongo; větve mohou být v mládí zprvu ochlupené; listy dlouhé 5 - 10,5cm, široké 2,5 - 4,5cm, báze může být asymetrická; květy mají 1 - 1,5cm stopku, listence vejčité až prakticky kulaté, dlouhé 1,3 - 2mm a široké 1,3 - 3,5mm

Baphia kirkii

oblasti: Keňa, Mosambik, Tanzánie

Roste v Mosambiku, Tanzánii a Keni v podobě stromu. Dorůstá výšky do 27m. Větve jsou v mládí převislé a plstnaté. Palisty jsou vytrvalé, široce vejčité až podlouhlé, hnědé, dlouhé 0,7 - 1,7cm a široké 1,4 - 3,8mm. Listy jsou široce vejčité až eliptické, tupé nebo zašpičatělé, kožovité, v mládí oboustranně ochlupené, dlouhé 3,8 - 13cm, široké 1,7 - 6,8cm, báze klínovitá, zakulacená, prakticky uťatá nebo téměř srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je prakticky vrcholový plstnatý úžlabní hrozen nebo nepravá lata délky 3,5 - 7,5cm, vlastní květy mají 0,6 - 1,8cm stopku, listence vstřícné, vejčité nebo podlouhlé, mohou být plstnaté, dlouhé 3 - 5mm, široké 1,5 - 3mm, kalich je 2laločný, dlouhý 0,9 - 1,5cm, pavéza dlouhá 1,2 - 2,6cm, široká 1,3 - 2,5cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem dřevnatý lusk délky 7,5 - 16,5cm, šířky 2,5 - 4,8cm a obsahuje 1 - 2 černá nebo tmavě hnědá semena délky 1,5 - 2,5cm a šířky 1 - 1,9cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. kirkii - Tanzánie; střední až vyšší strom; listence hnědě ochlupené, kalich na vrcholku ochlupený, pavéza dlouhá 1,7 - 2,6cm, široká 1,7 - 2,5cm, křídla a člunek dlouhé 1,5 - 2,2cm; lusky dlouhé do 12cm a široké 2,5cm
- subsp. ovata/B. ovata - výška do 10m; listence zprvu plstnaté, kalich žluto hnědě plstnatý, pavéza dlouhá 1,2 - 1,8cm, široká 1,3 - 1,8cm, křídla a člunek dlouhé 1,15 - 1,75mm; lusky dlouhé 7,6 - 12cm a široké 2,5 - 3cm

Baphia latiloi

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Kamerunu a Nigérii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 9m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou podlouhlé až úzce obvejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 5 - 10,5cm, široké 1,6 - 4,1cm, báze je zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete po 1 - 3ks úžlabními květy na 0,7 - 1,5cm stopce, listence jsou vstřícné, 1/2kulaté, na okraji ochlupené, dlouhé 0,5 - 0,8mm, široké 1,5 - 2mm, kalich je toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,25 - 1,35cm, pavéza dlouhá 1,3 - 1,5cm, široká 1,1 - 1,5cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý lusk.

Baphia laurentii

synonyma: *B. lescrauwaetii*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 7 - 14,5cm, široké 3,5 - 5cm, báze je klínovitá (i zakulacená), žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,5cm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky do 3,5cm, vlastní květy mají 0,5 - 1,45cm stopku, listence vstřícné, vejčité, tupé, plstnaté, dlouhé 1,1 - 1,5mm, široké 1,5 - 2mm, kalich je 2laločný, plstnatý, dlouhý 8 - 9mm, pavéza je dlouhá 1 - 1,4cm, široká 1,25 - 1,6cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je plstnatý lusk délky 8,5 - 12,5cm, šířky 1,5 - 2,8cm, obsahuje 1 - 2 čočkovitá hnědá semena délky 1,8 - 2cm a šířky 1 - 1,2cm.

Baphia laurifolia

synonyma: *B. crassifolia*, *B. crassifolia* var. *dusenii*, *B. densiflora*, *B. lancifolia*, *B. myrtifolia*, *B. odorata*, *B. pierrei*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie, Republika Kongo, Rovnicková Guinea, Středoafriická Republika

Roste v Nigérii, Kamerunu, Středoafriické Republice, Rovnickové Guineji, Demokratické Republice Kongo, Republice Kongo a Gabonu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické až vejčité nebo obkopinaté, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 6 - 18cm, široké 2 - 9cm, báze je zakulacená, tupá až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je až 9tičetný úžlabní svazeček, vlastní květy mají 0,7 - 3,5cm stopku, listence jsou střídavé, široce vejčité až prakticky kulaté, pohárkovité, plstnaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 2 - 3,1mm, kalich toulcovitý, plstnatý, dlouhý 1 - 1,6cm, pavéza je dlouhá i široká 1,3 - 1,9cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je obkopinatý až úzce obvejčitý lusk délky 9 - 16,5cm, šířky 2 - 3cm, obsahuje 1 - 2 hnědá semena délky 1,2 - 1,5cm a šířky 1,2 - 1,4cm.

Baphia leptobotrys

synonyma: *B. leptobotrys* subsp. *leptobotrys*, *B. leptobotrys* subsp. *silvatica*, *B. silvatica*

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie

Roste v Nigérii, Kamerunu a Gabonu v podobě i rozkladitého keře, liány nebo stromu. Listy jsou široce vejčité až úzce eliptické, zašpičatělé v délce až 5cm, mohou být kožovité, dlouhé 8 - 23,8cm,

široké 3,5 - 9,5cm, báze je zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní hrozen nebo nepravá lata délky 2,2 - 16cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, listence na bázi srostlé, podlouhlé, zelené, dlouhé 2 - 6,5mm, kalich je toulcovitý, dlouhý 0,8 - 1,45cm, pavéza je dlouhá 1,1 - 1,8cm, široká 1,2 - 2,4cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý tmavý lusk délky 10 - 18cm, šířky 2 - 2,5cm, obsahuje 2 - 4 hnědá semena délky 1,6 - 2cm a šířky 1,3 - 1,6cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. leptobotrys - Nigérie, Kamerun; vzpřímený nebo rozkladitý keř; listy až kožovité; hrozny dlouhé 2,2 - 14cm, listence dlouhé 2 - 3,5mm, široké 1 - 1,5mm, kalich dlouhý 0,8 - 1cm, pavéza dlouhá 1,1 - 1,4cm, široká 1,2 - 1,4cm, křídla dlouhá 1,25 - 1,4cm, široká 4 - 5mm, člunek dlouhý 1,1 - 1,25cm a široký 4 - 5mm
- subsp. silvatica/B. silvatica - menší strom, i liánovitý; listy kožovité; hrozny dlouhé 4 - 16cm, listence dlouhé 3 - 6,5mm, široké 1,4 - 2,1mm, kalich dlouhý 0,9 - 1,45cm, pavéza dlouhá 1,2 - 1,8cm, široká 1,2 - 2,4cm, křídla dlouhá 1,25 - 1,8cm, široká 4,5 - 6,5mm, člunek dlouhý 1,2 - 1,5cm a široký 4 - 5mm

Baphia leptostemma

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie

Roste v Nigérii, Kamerunu a Gabonu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 12m. Větve mohou být v mládí řídkce ochlupené. Listy jsou eliptické mírně vejčité nebo mírně obvejčité, zašpičatělé v délce 0,5 - 2,5cm, mohou být až téměř kožovité, dlouhé 5 - 14cm, široké 2,5 - 8cm, báze je zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,35 - 1cm. Květe samostatnými nebo párovými úžlabními květy v nepravém hrozně, vlastní květy mají 0,8 - 2,5cm stopku, listence jsou vstřícné, prakticky kulaté, dlouhé 0,5 - 1mm, široké 1 - 3mm, kalich toulcovitý s chloupky na vrcholu, dlouhý 1 - 1,6cm, pavéza je dlouhá 1 - 1,6cm, široká 1 - 1,25cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je lusk délky 10 - 14,5cm, šířky 2 - 3cm a obsahuje 2 - 4 hnědá semena délky 1,2 - 1,4cm a šířky 1 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. gracilipes/B. gracilipes - větve v mládí ochlupené; listy občas prakticky kožovité a řapíky dlouhé 0,4 - 1cm; listence šupinovitě až prakticky kulaté (i pohárkovité), široké 1 - 1,5mm, vlastní květy mají 0,7 - 2,5cm stopku, pavéza dlouhá 1 - 1,2cm
- var. gracilipes - Nigérie až Kamerun; větve v mládí max. řídkce ochlupené; semeníky holé
- var. conraui/B. conraui - Kamerun; větve v mládí ochlupené; listy papírovité; semeníky ochlupené
- subsp. leptostemma - Kamerun a Gabon; větve v mládí holé; listy mohou být kožovité, řapíky dlouhé 3,5 - 8mm; listence prakticky kulaté, pohárkovité, široké 1,2 - 3mm, vlastní květy mají 0,8 - 2,5cm stopku, pavéza je dlouhá 1,2 - 1,6cm; semeníky holé

Baphia letestui

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Republika Kongo

Roste Gabonu, Demokratické Republice Kongo, Republice Kongo a Angole v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 6m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou úzce kopinaté, úzce eliptické nebo vejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 3 - 10,5cm, široké 1,5 - 4,6cm, báze zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,3cm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 1,4 - 2cm stopce, listence jsou vstřícné, vejčité nebo kopinaté, dlouhé 5,5 - 7,5mm, široké 2 - 3,5mm, kalich je toulcovitý, dlouhý 2 - 2,5cm, pavéza je obvejčitá až úzce eliptická, dlouhá 2,6 - 2,8cm, široká 1,3 - 1,7cm a křídla s člunkem jsou na bázi ochlupené. Plodem je tmavě hnědý zprvu ochlupený tmavě hnědý lusk délky 8,2 - 10,5cm, šířky 2,2 - 2,6cm a obsahuje 2 - 4 černá semena délky 1,4 - 1,8cm a šířky 1 - 1,3cm.

Baphia longipedicellata

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Keňa

Roste v Keni a Demokratické Republice Kongo v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 30m. Větve mohou být v mládí řídce ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, zašpičatělé, zvlněné, dlouhé 3,8 - 13,5cm, široké 2 - 5cm, báze je zakulacená až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,2cm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy na 1 - 3,8cm stopce, listence jsou vstřícné, na bázi 3úhle vejčité, dlouhé 1 - 2,8mm, široké 0,6 - 1,8mm, kalich je toulcovitý, řídce ochlupený, dlouhý 0,8 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1,3 - 1,8cm, široká 1,3 - 1,6cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je lusk délky 4 - 4,5cm a šířky 1,4 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *keniensis*/B. *keniensis* - Keňa; větve mohou být v mládí ochlupené; listence jsou vejčité až úzce 3úhlé, dlouhé 1 - 2,8mm, kalich je dlouhý 0,8 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1,3 - 1,8cm, široká 1,3 - 1,7cm, křídla a člunek je dlouhý 1,4 - 1,6cm
- subsp. *longipedicellata* - Demokratická Republika Kongo; větve mohou být v mládí ochlupené; listence jsou 3úhle vejčité, dlouhé 1 - 1,3mm, kalich je dlouhý 0,9 - 1cm, pavéza je dlouhá 1,4 - 1,6cm, široká 1,4 - 1,5cm, křídla a člunek je dlouhý 1,35 - 1,5cm

Baphia macrocalyx

synonyma: B. *mocimboensis*

oblasti: Mosambik, Tanzánie

Roste v Mosambiku a Tanzánii v podobě stromu. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou obvejčitě obkopinaté až eliptické, vykrojené nebo tupé, tlustě kožovité, dlouhé 4 - 14cm, široké 3 - 6,2cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 5cm. Květenstvím je nepravá plstnatá lata délky 12 - 16cm, vlastní květy mají 0,4 - 1,2cm stopku, listence prakticky kulaté, na bázi zakulacené až klínovité, dlouhé 3 - 6mm, široké 3 - 5,5mm, kalich toulcovitý, ochlupený, zpravidla s 5ti zuby, dlouhý 1,4 - 1,9cm, pavéza bílá, narůžovělá nebo fialová, dlouhá i široká 1,6 - 2,5cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je plstnatý lusk délky 15,5 - 17,5cm, šířky 1,4 - 2,5cm, obsahuje 1 - 4 čočkovitá semena délky 1,7 - 2cm a šířky 1,4 - 1,5cm.

Baphia madagascariensis

Baphia mambillensis

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Nigérii a Kamerunu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 25m. Větve jsou vzácně v mládí plstnaté. Listy jsou podlouhlé až úzce obvejčité, zašpičatělé v délce až 2,2cm, prakticky kožovité, dlouhé 4,5 - 15cm, široké 2,7 - 5,5cm, báze zpravidla asymetrická, zakulacené až prakticky klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy na 0,8 - 2,6cm stopce, listence jsou vstřícné, 1/2kulaté, pohárkovité, na okraji ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 2,5 - 4,2mm, kalich toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,3 - 1,7cm, pavéza dlouhá i široká 1,5 - 2,2cm a křídla s člunkem s kapsou na bázi. Plodem je zploštělý zobákovitý bledě hnědý lusk délky 10 - 12,5cm, šířky 2 - 2,5cm, obsahuje 1 - 2 hnědá semena délky 1 - 1,25cm a šířky 0,8 - 1cm.

Baphia massaiensis

oblasti: Angola, Botswana, Demokratická Republika Kongo (Zair), Malawi, Mosambik, Namibie, Tanzánie, Transvaal, Zambie, Zimbabwe

Roste v jižní Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 4 (i 10)m. Větve jsou v mládí sametové. Borka je tmavě hnědá až červeně černá, hladká nebo svisle rozpukaná s vodorovnými prasklinami. Listy jsou obvejčité až vejčité nebo prakticky kulaté, špičaté až zašpičatělé, prakticky kožovité, zelené, dlouhé 2,2 - 12cm, široké 1 - 8cm, báze je zakulacená, klínovitá (i prakticky srdčitá), žilnatinu tvoří 4 - 11 párů žilek a spodní strana je světle zelená. Květenstvím je až 16tičetné, úžlabní, dlouhé 5 - 8cm, aromatické, vlastní květy jsou bílé, mají 0,4 - 2,3cm stopku, listence vstřícné, podlouhlé, dlouhé 1,5 - 5mm, široké 0,5 - 1,8mm, kalich toulcovitý, ochlupený, se 2 - 5ti zuby, dlouhý 0,7 - 1,3cm, pavéza béžová, narůžovělá nebo nafialovělá, dlouhá 0,9 - 2,5cm, široká 1 - 1,9cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je prakticky černý nebo růžově fialově hnědý lesklý lusk délky 5 - 17cm, šířky 1,2 - 2,2cm, obsahuje 1 - 2 červeně růžová semena délky 0,7 - 1,2cm a šířky 6,5 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *busseana* - Tanzánie a Malawi; listy jsou oboustranně ochlupené, dlouhé 5 - 12cm, široké 3 - 5cm a řapíky dlouhé 1 - 2,3cm; květy v úžlabních svazečcích, stopky a poupata ochlupená, pavéza dlouhá i široká 0,9 - 1cm, semeníky hustě hnědě ochlupené
- subsp. *floribunda* - Demokratická Republika Kongo a Zambie; listy zprvu ochlupené, dlouhé 4 - 8,5cm, široké 2,5 - 6,5cm, spodní strana řídce ochlupená a řapíky dlouhé 0,45 - 2,8cm; květy v úžlabních svazečcích, stopky a poupata ochlupená, pavéza dlouhá 1,5 - 2,45cm, široká 1,3 - 2cm, semeníky hustě šedo bíle ochlupené
- subsp. *gomesii* - Tanzánie a Mosambik; listy dlouhé 4 - 8,7cm, široké 1,8 - 4,5cm, spodní strana může být ochlupená, řapíky dlouhé 1 - 3,3cm; květenstvím je úžlabní svazeček s krátkou stopkou, stopky a poupata ochlupená, pavéza dlouhá 0,7 - 1,4cm, široká 0,8 - 1,3cm, semeníky zpravidla ochlupené
- subsp. *massaiensis* - Tanzánie; listy dlouhé 3,4 - 6,6cm, široké 1,8 - 3,8cm, spodní strana řídce ochlupená a řapíky dlouhé 0,6 - 1,6cm; květenstvím je úžlabní svazeček (i zdánlivý vrcholík), stopky a poupata ochlupená, pavéza dlouhá 1,3 - 1,7cm, široká 1,3 - 1,6cm, semeníky šedo bíle ochlupené
- subsp. *obovata* - listy min. v mládí ochlupené, dlouhé 2,2 - 10,4cm, široké 1,4 - 7,5cm, řapíky dlouhé 0,4 - 2cm; květenstvím je úžlabní svazeček nebo protáhlý nepřavý hrozen či vrcholík, větve a

stopky s poupaty ochlupené, pavéza dlouhá 1 - 2,2cm, široká 1,2 - 1,85cm, semeníky bělavě nebo hnědě ochlupené

- var. *cornifolia*/B. *cornifolia*/subsp. *cornifolia* - Angola; listy prakticky kožovité, dlouhé 2,2 - 3,5cm, široké 1 - 1,4cm, řapíky dlouhé 4 - 6mm; stopky květů a poupata ochlupená, kalich hnědý, dlouhý 0,9 - 1cm, korunní lístky bílé, semeníky ochlupené

- var. *obovata* - Zambie, Zimbabwe, Botswana, Angola, Namibie a JAR; listy zpravidla srdčité, (i kožovité), dlouhé 2,2 - 10,4cm, široké 1,4 - 6cm a řapíky dlouhé 0,25 - 1,8cm; květenstvím je úžlabní svazeček nebo protáhlý hrozen či vrcholík, stopky a poupata ochlupená, kalich hnědý, narůžovělý až nafialovělý, dlouhý 0,9 - 1,3cm, korunní lístky zpravidla bílé (i béžové nebo červené) a semeníky ochlupené

- var. *whitei* - Zambie a Angola; listy kožovité, dlouhé 5 - 9,8cm, široké 3 - 7,5cm a řapíky dlouhé 0,7 - 2cm; květy mají stopky a poupata hnědě ochlupené, kalich narůžověle fialový, dlouhý 0,8 - 1,3cm, korunní lístky růžově fialové, světle růžové nebo bílé, semeníky hustě hnědě ochlupené

Baphia maxima

synonyma: B. *compacta*, B. *longepetiolata*, B. *orbiculata*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie

Roste v Nigérii, Kamerunu, Gabonu a Demokratické Republice Kongo v podobě liánovitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 14m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou podlouhlé až prakticky kulaté, zašpičatělé, tupé nebo vykrojené, kožovité, v mládí plstnaté, dlouhé 8 - 20cm, široké 4,5 - 11,5cm, báze kulatá až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 11,5cm. Květenstvím je úžlabní svazeček, vlastní květy mají 0,8 - 1,9cm stopku, listence mohou být na bázi srostlé, vejčité až kopinaté nebo mírně 3úhlé, plstnaté, dlouhé 8 - 9mm, široké 2 - 5mm, kalich toulcovitý, plstnatý, s 2 - 4mi zuby, dlouhý 1,4 - 1,7cm, pavéza dlouhá 1,6 - 1,8cm a široká 1,8 - 2,5cm. Plodem je zprvu ochlupený lusk délky 10 - 20cm, šířky 1,7 - 3cm a obsahuje hnědá nebo černá semena délky 1,2 - 2cm a šířky 1,7 - 2,5cm.

Baphia megaphylla

Baphia multiflora

synonyma: B. *capparidifolia* subsp. *multiflora*

Baphia nitida

synonyma: B. *angolensis*, B. *barombiensis*, B. *haematoxylon*, B. *nitida* var. *pubescens*, B. *pyrifolia*, *Carpolobia versicolor*, *Dalhousiea haematoxylon*, *Dalhousiea pyrifolia*, *Delaria pyrifolia*, *Podalyria haematoxylon*

oblasti: Benin, Fernando Poo, Gabon (Gabun), Ghana, Kamerun, Libérie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Senegal, Sierra Leone, Togo

Roste v centrální západní Africe v podobě stálezeleného stromu nebo keře s mnoha kmeny. Dorůstá výšky do 9m. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až úzce eliptické, obvejčité nebo kopinaté, zašpičatělé, mohou být prakticky kožovité, dlouhé 5 - 21cm, široké 3 - 9cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květenstvím

je úžlabní 1 - 5tikvětý svazeček, vlastní květy mají 0,3 - 1,7cm stopku, listence vstřícné, široce vejčité, prakticky kulaté nebo ledvinité, na okraji ochlupené, dlouhé 1,5 - 2,5mm, široké 1,5 - 3,2mm, kalich toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 0,8 - 1cm, pavéza je bílá, dlouhá i široká 1,3 - 2cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi. Plodem je lusk délky 8 - 16,5cm, šířky 1 - 1,5cm, obsahuje 1 - 4 hnědá semena délky i šířky 1 - 1,5cm.

Baphia obanensis

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Kamerunu a Nigérii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické, lopatkovitě zašpičatělé v délce až 1,5cm, dlouhé 7,4 - 16,2cm, široké 4,1 - 7,8cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm.

Květenstvím je krátký úžlabní až 35tikvětý nepravý hrozen nebo svazeček, vlastní květy mají 0,6 - 1,4cm stopku, listence vstřícné, široce vejčité až prakticky kulaté, na okraji ochlupené, dlouhé 0,8 - 1,2mm, široké 2,2 - 2,5mm, kalich toulcovitý, na vrcholu vykrojený a ochlupený, dlouhý 0,7 - 1cm, pavéza je dlouhá i široká 1 - 1,1cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi.

Baphia pauloi

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě stromu. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou eliptické nebo obvejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 3,5 - 5,8cm, široké 1,7 - 3cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Květenstvím je úžlabní hrozen nebo nepravá lata délky do 1,5 - 2cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,5cm stopku, listence na bázi srostlé, vejčité, řídce ochlupené, dlouhé do 1,5mm, kalich toulcovitý, ochlupený, dlouhý 5 - 6mm, pavéza je dlouhá 8,5 - 9,5mm, široká 1 - 1,1cm a křídla s člunkem mají kapsu na bázi. Plodem je lusk.

Baphia pilosa

synonyma: *B. batangensis*, *B. calophylla*, *B. elegans*, *B. elegans* var. *vestita*, *B. klainei*, *B. klainei* var. *patulopilosa*, *B. pilosa* subsp. *batangensis*, *B. pilosa* subsp. *pilosa*, *B. vermeulenii*, *Baphiastrum bequaertii*, *Baphiastrum calophylla*, *Baphiastrum claessensii*, *Baphiastrum elegans*, *Baphiastrum klainei*, *Baphiastrum klainei* var. *patulopilosum*, *Baphiastrum pilosa*, *Baphiastrum vermeulenii*

oblasti: Cabinda, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Republika Kongo, Rovnická Guinea

Roste v Angole, Demokratické Republice Kongo, Gabonu, Kamerunu, Republice Kongo a Rovnické Guiney v podobě šplhavého keře nebo liány. Dorůstá délky až 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou vytrvalé i opadavé, kopinaté, vejčité nebo podlouhlé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,5cm a široké 2 - 5mm. Listy jsou vejčité, eliptické úzce obvejčité nebo úzce kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, mohou být prakticky kožovité, dlouhé 3,5 - 20cm, široké 1,5 - 9cm, báze je zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní hrozen nebo nepravá lata délky 2 - 5cm, listeny jsou kopinaté nebo vejčité, vytrvalé nebo opadavé, vlastní květy mají 0,7 - 1,9cm stopku, listence jsou podlouhlé, občas vejčité, dlouhé 2,5 - 9,5mm, široké 1,5 - 3,5mm, kalich je toulcovitý, ochlupený, dlouhý 0,9 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1 - 1,7cm, široká 1,1 - 2cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý načervenalý zprvu ochlupený lusk délky 6 - 8cm, šířky 1,2 - 2cm, obsahuje tmavě 1 - 2 hnědá semena délky 1,4 - 1,6cm a šířky 1,1 - 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. batangensis/B. batangensis/B. calophylla/B. elegans/B. elegans var. vestita/B. klainei/Baphiastrum colophyllum - Kamerun, Gabon, Demokratická Republika Kongo; mladé větve, osa květenství, stopky květů a poupata krátce přitiskle hnědo rezavě ochlpuená
- subsp. pilosa - Gabon, Demokratická Republika Kongo a Angola; mladé větve, osa květenství, stopky květů a poupata dlouze až krátce žluto hnědě zpravidla odstále ochlpuené

Baphia polyantha

synonyma: B. spathacea subsp. polyantha

Baphia pubescens

synonyma: B. acuminata, B. bancoensis, B. solheidi

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Kamerun, Libérie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Togo

Roste v Ghaně, Libérii, Pobřeží Slonoviny, Togu, Nigérii, Kamerunu, Gabonu a Demokratické Republice Kongo v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 15m. Větve jsou v mládí plstnaté nebo ochlpuené. Palisty jsou podlouhlé, opadavé až prakticky vytrvalé, dlouhé 0,4 - 1,25cm a široké 1 - 2,5mm. Listy jsou eliptické, obvejčité, vejčité nebo úzce kopinaté (i prakticky kulaté), zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 3,5 - 16cm, široké 1,5 - 5,5cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, spodní strana plstnatá až ochlpuená, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenstvím je (1 -) 2 - 4květý úžlabní svazeček, vlastní květy mají 0,3 - 1,1cm stopku, listeny jsou vstřícné, široce vejčité, 1/2kulaté, pohárkovité, plstnaté až ochlpuené, dlouhé 1 - 2,2mm, široké 2,3 - 3,4mm, kalich toulcovitý, min. z části ochlpuený, dlouhý 1 - 1,7cm, pavéza je dlouhá 1 - 1,8cm, široká 1,1 - 1,85cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý hnědý zprvu ochlpuený lusk délky 5 - 11,2cm, šířky 1,5 - 2,1cm a obsahuje 1 - 3 hnědá semena délky 1 - 1,5cm a šířky 0,7 - 1cm.

Baphia puguensis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 14m. Větve mohou být v mládí ochlpuené. Listy jsou obvejčité nebo obkopinaté, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 3 - 6,8cm, široké 1,4 - 2,4cm, báze je asymetrická a zakulacená, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Kvete samostatnými úžlabními aromatickými květy na 1,3 - 1,8cm stopce, listence jsou vstřícné, 1/2kulaté až ledvinité, pohárkovité, na okraji ochlpuené, dlouhé 0,5- 1,5mm, kalich je toulcovitý, dlouhý 0,9 - 1cm, pavéza dlouhá 1,2 - 1,5cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý hnědý lusk délky 6 - 8,5cm, šířka 1,6 - 1,8cm a obsahuje 1 - 2 hnědá semena.

Baphia punctulata

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Mosambik, Tanzánie

Roste v Tanzánii, Mosambiku a Demokratické Republice Kongo v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 7m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou obvejčitě eliptické, kopinaté nebo obkopinaté, zašpičatělé, kožovité, lesklé, dlouhé 3,5 - 9,5cm, široké 1,5 - 3,5cm, báze je zakulacená, asymetrická, spodní strana zprvu ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,46 - 1cm. Květenstvím je 1 - 5tkvětý úžlabní svazeček, vlastní květy mají 1 - 2cm stopku, listence jsou vstříčné, 1/2kulaté až ledvinité, pohárkovité, plstnaté, dlouhé 0,5 - 2mm, široké do 3mm, kalich je toulcovitý, zpravidla plstnatý, dlouhý 0,8 - 1,6cm, pavéza je dlouhá 0,8 - 2,4cm, široká 1,1 - 2,2cm, křídla i člunek jsou dlouhé 0,8 - 2cm, široké 0,5 - 8,9cm a mají na bázi kapsu. Plodem je hnědo černý lusk délky 4,5 - 8,5cm, šířky 1,5 - 2,2cm a obsahuje hnědá čočkovitá semena délky 1,4 - 1,6cm a šířky 1,1 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *descampsii*/B. *descampsii* - Demokratická Republika Kongo a Tanzánie; keř nebo strom; výška do 7m; listy vejčité nebo obkopinaté, řapíky dlouhé 0,45 - 1cm; kalich hnědě plstnatý, dlouhý 1,4 - 1,6cm, pavéza dlouhá 1,5 - 2,4cm, široká 1,5 - 2,2cm
- subsp. *palmensis* - Mosambik; keř; výška do 2m; listy kopinaté nebo eliptické, řapíky dlouhé 0,6 - 1cm; květy mají stopky delší řapíků, ochlupené, kalich holý, pavéza dlouhá 0,8 - 1,05cm, široká 1,18cm, semeníky mají chloupky na 1 okraji
- subsp. *punctulata* - Tanzánie; menší strom; listy mohou mít řapíky hnědě plstnaté a dlouhé 0,6 - 1,9cm; květy mají 1 - 1,2cm stopku, kalich hnědě plstnatý, dlouhý 8 - 9,2mm, pavéza dlouhá 0,8 - 1,05cm, široká 1,18cm, semeníky mají chlupy na obou okrajích

Baphia rosa

Baphia semseiana

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické, zakulacené nebo tupé (i vykrojené), kožovité, dlouhé 6,1 - 20cm, široké 3,7 - 7,3cm, báze je zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5,2 - 10cm. Květenstvím je vrcholová nebo úžlabní nepravá plstnatá lata délky 4 - 25cm, vlastní květy mají 0,5 - 1,5cm stopku, listence vstříčné, vejčité, plstnaté, dlouhé 2 - 3mm, široké 2 - 2,3mm, kalich je 2laločný, 2 - 3zubý, plstnatý, dlouhý 1,1 - 1,5cm, pavéza je bílá, narůžovělá až fialová, dlouhá 1,6 - 2,3cm, široká 1,7 - 2,3cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je zprvu plstnatý lusk délky 7 - 10,2cm, šířky 1,6 - 1,9cm, obsahuje 1 - 2 čočkovitá semena délky 1 - 1,5cm a šířky 1,2 - 1,4cm.

Baphia spathacea

synonyma: *B. dinklagei*, *B. spathacea* subsp. *spathacea*, *Baphiastrum spathaceum*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Libérie, Sierra Leone

Roste v Africe v podobě rozkladitého nebo šplhavého keře, liány nebo stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou podlouhlé, eliptické nebo úzce obvejčité, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 5 - 16,3cm, široké 3,6 - 6,6cm, báze je tupá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,2cm. Květenstvím je úžlabní svazeček, vlastní květy mají 0,5 - 1,2cm stopku, listence vstříčné, 3úhle vejčité až prakticky kulaté, plstnaté, opadavé, dlouhé 1,2 - 2mm, široké 1,2 -

2,8mm, kalich je toulcovitý, zahnutý, plstnatý až ochlupený, dlouhý 1 - 1,5cm, pavéza je dlouhá 1,2 - 1,75cm, široká 1,1 - 1,55cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý dřevnatý zprvu ochlupený tmavě hnědý lusk délky 6,8 - 9cm, šířky 1,7 - 2cm a obsahuje 2 - 3 hnědá semena délky 1,2 - 1,4cm a šířky 1,1 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *polyantha*/B. *polyantha* - Kamerun, Gabon, Demokratická Republika Kongo; rozkladitý keř, strom nebo liána; listy dlouhé 5 - 16,3cm, široké 3,6 - 6,6cm, řapíky dlouhé 1,5 - 3,2cm; květy mají 0,5 - 1,3cm stopku, listence 3úhle vejčité, dlouhé 1,2 - 1,8mm, široké 1,2 - 2mm, kalich dlouhý 1 - 1,5cm, pavéza široce vejčitá až prakticky kulatá, dlouhá 1,2 - 1,7cm a křídla s člunkem dlouhé 1,2 - 1,7cm

- subsp. *spathacea* - Sierra Leone a Libérie; rozkladitý keř nebo liána; listy dlouhé 6,5 - 13cm, široké 3,8 - 6,1cm, řapíky dlouhé 1 - 1,8cm; květy mají 6,5 - 8mm stopku, listence prakticky kulaté, dlouhé 1,6 - 2mm, široké 2,2 - 2,8mm, křídla s člunkem dlouhé 1,3 - 1,8cm

Baphia speciosa

oblasti: Zambie

Roste v Zambii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce eliptické, tupé nebo zakulacené, mohou být kožovité, dlouhé 5,5 - 7,6cm, široké 2,7 - 4,5cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, spodní strana může být ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,6cm. Květenstvím je řídká vrcholová lata délky 7 - 14cm, vlastní květy mají 0,7 - 1,2cm stopku, listence vstříčné, 3úhlé až kopinaté, plstnaté, dlouhé 0,6 - 1,1cm, široké 1,5 - 4,5mm, kalich toulcovitý, ochlupený, dlouhý 1,4 - 2cm, pavéza dlouhá 1,8 - 2,5cm, široká 2 - 2,6cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je lusk.

Baphia vili

Baphia wollastonii

synonyma: B. *brevipedicellata*, B. *dewevrei* f. *intermedia*, B. *dewevrei* var. *fluminea*, B. *glabra*, B. *glabra* var. *oblongifolia*, B. *mildbraedii*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Uganda

Roste v Demokratické Republice Kongo a Ugandě v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m. Listy jsou vejčité, eliptické nebo obkopinaté, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 3 - 10,2cm, široké 2 - 4cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květe samostatnými nebo párovými květy na 0,4 - 2,4cm stopce, listence jsou vstříčné, široce vejčité, 1/2kulaté až prakticky kulaté, pohárkovité, na okraji ochlupené, dlouhé 1,5 - 2,6mm, široké 3,5 - 5mm, kalich toulcovitý, na vrcholu ochlupený, dlouhý 1,5 - 2,1cm, pavéza je dlouhá 1,7 - 2,5cm, široká 1,8 - 2,2cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý dřevnatý hnědý lusk délky 6 - 9cm, šířky 1,5 - 2,5cm a obsahuje 1 - 2 hnědá semena délky 1 - 1,25cm a šířky 0,8 - 1cm.

Další informace:

<http://dabaze.dendrologie.cz/domains/dabaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1581>

<https://www.rostliny.net/>