

Baphia pubescens

synonyma: Baphia acuminata, Baphia bancoensis, Baphia solheidi

čeleď: Fabaceae

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Kamerun, Libérie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Togo

Roste v Ghaně, Libérii, Pobřeží Slonoviny, Togu, Nigérii, Kamerunu, Gabonu a Demokratické Republice Kongo v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 15m. Větve jsou v mládí plstnaté nebo ochlupené. Palisty jsou podlouhlé, opadavé až prakticky vytrvalé, dlouhé 0,4 - 1,25cm a široké 1 - 2,5mm. Listy jsou eliptické, obvejčité, vejčité nebo úzce kopinaté (i prakticky kulaté), zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 3,5 - 16cm, široké 1,5 - 5,5cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, spodní strana plstnatá až ochlupená, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenstvím je (1 -) 2 - 4kvěť úžlabní svazeček, vlastní květy mají 0,3 - 1,1cm stopku, listeny jsou vstřícné, široce vejčité, 1/2kulaté, pohárkovité, plstnaté až ochlupené, dlouhé 1 - 2,2mm, široké 2,3 - 3,4mm, kalich toulcovitý, min. z části ochlupený, dlouhý 1 - 1,7cm, pavéza je dlouhá 1 - 1,8cm, široká 1,1 - 1,85cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý hnědý zprvu ochlupený lusk délky 5 - 11,2cm, šířky 1,5 - 2,1cm a obsahuje 1 - 3 hnědá semena délky 1 - 1,5cm a šířky 0,7 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>