

## Uncaria hirsuta (Řemdihák srstnatý)

synonyma: Nauclea formosana, Neonauclea formosana, Ourouparia enormis, Ourouparia formosana, Ourouparia hirsuta, Ourouparia kawakamii, Uncaria formosana, Uncaria kawakamii, Uncaria uraiensis

čeleď: Rubiaceae

oblasti: J Čína, JV Čína, Tchaj-wan

Roste v Číně a na Tchaj-wanu jako liána. Kmínky jsou v mládí slabé, mohou být mírně 4hranné a ochlupené. Palisty jsou zpravidla opadavé, široce vejčité, ze 2/3 2laločnaté, drobně ochlupené, dlouhé 0,7 - 1cm, laloky jsou vejčité až kopinaté, špičaté až zašpičatělé a ochlupené. Listy jsou úzce kopinaté nebo eliptické, zašpičatělé, mohou být kožovité, mohou být drobně drsně ochlupené, dlouhé 8 - 12cm, široké 3,5 - 7cm, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová zpravidla párovitá ochlupená hlávka průměru 3 - 4cm, má 2,5 - 5cm stopku, listeny dlouhé 0,5 - 1cm, listence čárkovité nebo lopatkovité, dlouhé 2mm, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kalich je obkruželovitý, ochlupený, trubka dlouhá 2 - 4mm, laloky podlouhlé, dlouhé 2 - 3mm, koruna je světle žlutá nebo světle červená, vně drobně ochlupená, trubka dlouhá 0,7 - 1,1cm, laloky podlouhlé až eliptické, tupé nebo zakulacené a dlouhé 2 - 2,5mm. Plodenství je široké 3 - 3,5cm, vlastní plody jsou prakticky přisedlé, obvejčité, ochlupené, dlouhé 5 - 9mm a obsahují semena délky 1,5mm.

<https://www.rostliny.net/>