

Uncaria lanosa

synonyma: *Uruparia lanosa*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Kambodža, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundry, Melanésie, Myanmar (Barma), Papua-Nová Guinea, Queensland, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste na Tchaj-wanu, Andamanech, Kambodži, Myanmaru, Nikobarech, Thajsku, Vietnamu, Borneu, Jávě, Malých Sundách, Malajsi, Molukách, Filipínách, Sulawesi, Sumatře, Nové Guineji, Austrálii a Karolínských ostrovech v podobě dřevnaté popínavky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *appendiculata* - Tchaj-wan, Sulawesi, Filipíny; kmínky v mládí 4hranné, zprvu ochlupené; palisty občas vytrvalé, vejčité, z 1/3 - 1/2 laločnaté, dlouhé 0,6 - 1cm, široké 0,8 - 1cm, laloky úzce 3úhlé, špičaté až zašpičatělé; listy vejčité, kopinaté nebo úzce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, lesklé, dlouhé 7 - 11cm, široké 3,5 - 8cm, báze zakulacená, uťatá nebo mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky dlouhé 0,4 - 1cm; květenstvím je úžlabní nebo vrcholová samostatná nebo párovitá hlávka šířky 3 - 3,7cm, může být ochlupená, má 2,5 - 4,5cm stopku, listeny dlouhé 1cm, vlastní květy jsou přisedlé, kalich ochlupený, podlouhlý, laloky čárkovité, tupé, dlouhé 2mm, koruna řepicovitá, vně zprvu ochlupená, trubka dlouhá 1,2cm, laloky podlouhlé, tupé, dlouhé 2,5mm; plodenství široké 3 - 4cm, vlastní plody jsou stopkaté, vřetenovité, dlouhé 0,9 - 2,7cm, široké 1 - 3mm a obsahují semena délky 2,5 - 3mm

<https://www.rostliny.net/>