

# Uncaria rhynchophylla

synonyma: *Nauclea rhynchophylla*, *Ourouparia rhynchophylla*, *U. var. kouteng*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: J Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Tchaj-wanu a Vietnamu v podobě liány. Kmínky jsou v mládí 4hranné a občas nasivělé. Palisty bývají opadavé, kopinaté až vejčité, z až 4/5 2laločné, dlouhé 0,4 - 1,5cm, laloky jsou čárkovité, 3úhlé nebo vejčité a špičaté nebo zašpičatělé. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 5 - 12cm, široké 3 - 7cm, báze je klínovitá, tupá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová hlávka průměru 1,2 - 1,5cm vyrůstající samostatně nebo po 7 - 11ti ks, má 1,5 - 5cm stopku, listeny délky 1 - 4mm, listence jsou čárkovité nebo úzce lopatkovité, dlouhé 2mm, vlastní květy jsou přisedlé až téměř přisedlé, kalich obkruželovitý, ochlupený, dlouhý 1mm, okraj dlouhý 1mm, min. z 1/2 laločnatý, laloky 3úhlé až lopatkovité, špičaté až tupé, koruna je řepicovitá, vně ochlupená, trubka dlouhá 5,5 - 6mm, laloky jsou vejčité, zakulacené nebo tupé a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodenství je široké 1 - 2mm, plody jsou přisedlé, obvejčité až vřetenovité, ochlupené, dlouhé 5 - 7mm a semena jsou dlouhá 2 - 3mm.

<https://www.rostliny.net/>