

Uncaria tomentosa (Řemdihák plstnatý)

synonyma: Cinchona globifera, Nauclea aculeata, Nauclea polycephala, Nauclea surinamensis, Nauclea tomentosa, Orouparia polycephala, Orouparia tomentosa, Uncaria surinamensis, U. var. dioica

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Acre, Amazonas, Belize, Bolívie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Mato Grosso, Nikaragua, Panama, Peru, Rondonia, S Brazílie, Surinam, Venezuela

Roste v Brazílii, Trinidadu a Tobagu, Belize, Kostarice, Guatemale, Hondurasu, Nikarague, Panamě, Francouzské Guyaně, Guyaně, Surinamu, Venezuele, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru v podobě šplhavého nebo převislého silně háčkovité trnitého keře (i stromu). Dorůstá výšky 20 - 30m. Větve jsou 4hranné a zprvu ochlupené. Palisty jsou vejčité až 3úhle kulaté, tupé nebo zakulacené, ochlupené a dlouhé 0,6 - 1,1cm. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté až zašpičatělé, zelené, dlouhé 9,5 - 15,5cm, široké 5,5 - 8,5cm, báze je široce zakulacená nebo srdčitá, spodní strana plstnatá a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Květenstvím je hlávka o průměru 0,6 - 2cm, vlastní květy jsou bělavé, aromatické, kalich mírně 5tzubý, drobně ochlupený, koruna je plstnatá, dlouhá 0,6 - 1cm, laloky jsou eliptické nebo podlouhlé a zakulacené. Plodem je zakulacená tobolka délky 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>