

Gentianella campestris (Hořeček ladní)

synonyma: *Amarella vulgaris*, *Cicendia campestris*, *Eyrythalia campestris*, *Eyrythalia obtusifolia*, *Gentiana albiflora*, *Gentiana campestris*, *Gentiana campestris* f. *lutescens*, *Gentiana campestris* var. *germanica*, *Gentiana campestris* var. *hypericifolia*, *Gentiana catalaunica*, *Gentiana hypericifolia*, *Gentiana obtusifolia*, *Gentiana pascuorum*, *Gentiana spathulata*, *Gentiana suecica*, *Gentiana torneyana*, *Gentiana vaillantii*, *G.* subsp. *hypericifolia*, *Gentianella hypericifolia*, *Gentianella obtusifolia*, *Gentianella tetrandra*, *Gentianusa campestris*

čeleď: Gentianaceae

oblasti: Alpy, Česká republika, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Švédsko, Švýcarsko

Roste ve střední a severní Evropě. Lodyžní listy mají kopinatý tvar. Kvete světlými růžovofialovými 4četnými zvonkově tvarovanými květy s nestejně širokými víceméně nepodvinutými okvětními lístky. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *baltica* (Hořeček ladní pobaltský) - jednoletka, severní Evropa, výška 15 (i 20)cm, kopinaté lodyžní listy délky 1,5 - 3cm a šířky kolem 7mm
- subsp. *campestris* (Hořeček ladní pravý) - na jedné lodyze bývá více než 10 květů, u nás pravděpodobně vyhynulý A1
- subsp. *suecica* (Hořeček ladní švédský) - dvouletka, severní a střední Evropa, výška 5 - 15cm, fialové květy se 4mi okvětními lístky

Vyhovují mu sušší i vlhké louky s nižším porostem s nižším obsahem živin.

<https://www.rostliny.net/>