

## Haworthiopsis limifolia (Haworthie hrázkatá)

synonyma: *Haworthia keithii*, *Haworthia limifolia*, *Haworthia limifolia* f. *major*, *Haworthia limifolia* f. *marlothiana*, *Haworthia limifolia* f. *pimentellii*, *Haworthia limifolia* f. *schuldtiana*, *Haworthia limifolia* var. *diploidea*, *Haworthia limifolia* var. *keithii*, *Haworthia limifolia* var. *limifolia*, *Haworthia limifolia* var. *marlothiana*, *Haworthia limifolia* var. *schuldtiana*, *Haworthia limifolia* var. *stolonifera*, *Haworthia limifolia* var. *tetraploidea*

čeleď: Asphodelaceae

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik, Mpumalanga, Svazijsko

Roste v JAR, Svazijsku a Mosambiku. Listy vytvářejí 12 - 30tičetnou růžici o průměru 2 - 7 (i 7,5)cm, vlastní listy jsou 3úhlé, kýlnaté, žlábkovité, mírně nadvinuté, příčně v liniích hrbolaté a hnědě zelené, dlouhé 3 - 10cm, široké 2 - 4cm a tlusté 6mm. Květenství má 30 - 35 (i 40)cm stonek, sterilní listeny jsou vejčité, zašpičatělé, vzpřímené, kýlnaté, dlouhé 7mm, hrozen má délku do 15cm, je převislý, tvořený 12 - 25ti květy ve spirále, listeny jsou 3úhlé, špičaté, kýlnaté, dlouhé 3mm, s růžovými až červenými žilkami, vlastní květy mají až 6mm stopku, koruna je bílá až narůžovělá, dlouhá 1,5cm a trubka má průměr 3,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *arcana*
- var. *gigantea*
- var. *glaucophylla*
- var. *limifolia*
- 'Marloth'
- var. *ubomboensis* - Ubombo Montains (Svasijsko a JAR); velikost do velikosti 15cm; na slunci hnědě fialové; květy bílé
- var. *viscosa*

Odolává teplotám do -1°C. Zimujeme na světlém stanovišti, bez zálivky při 10°C.

Množí se podzemními stolony, semeny nebo listovými řízkami.

<https://www.rostliny.net/>