

Maytenus boaria

synonyma: Boaria molinae, Celastrus boaria, Celastrus maytenus, Celastrus uncinatus, Maytenus angustifolia, M. var. angustifolia, M. var. latifolia, Maytenus chilensis, Maytenus chilensis var. angustifolius, Maytenus crenulata, Maytenus marginata, Maytenus pendulina, Maytenus uncinata, Senacia maytenus

čeleď: Celastraceae

oblasti: Bolívie, Córdoba, J Argentina, J Čile, Kalifornie, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, S Argentina, S Čile, Santa Catarina, Sao Paulo, Střední Čile, SV Argentina, SZ Argentina

Roste v Brazílii, Argentině, Čile a Bolívii v podobě stálezeleného keře nebo stromu a zavlečený byl do USA. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 25)m (v Evropě 2 - 3m) a téměř stejné šířky. Větve jsou slabé, zelené a v mládí převislé. Listy jsou vejčitě kopinaté až úzce eliptické, drobně pilovité, lesklé, kožovité a dlouhé 2,5 - 5cm. Květenstvím je 2 - 5tikvětý svazeček, vlastní květy jsou drobné hvězdicovité bělavé a nazelenalé. Plodem je žlutá tobolka obsahující 2 semena v červeném míšku. Existuje vnitrodruhový taxon:

- "Worplesdon Narrow" - úzký vzpřímený habitus; samičí

<https://www.rostliny.net/>