

Picrasma quassioides (Hořčina hořkoňová)

synonyma: *Nima quassioides*, *Picrasma ailanthoides*, *Picrasma ailanthoides* var. *dasycarpa*, *Picrasma japonica*, *P. f. dasycarpa*, *P. f. glabrescens*, *P. var. dasycarpa*, *P. var. glabrescens*, *P. var. quassioides*, *Rhus ailanthoides*, *Simaba quassioides*, *Zwingera quassioides*

čeleď: Simaroubaceae

oblasti: Himálaj, Japonsko, Korea, Pákistán, Střední Čína, Tchaj-wan, V Čína

Roste v Pákistánu, Číně, Tchaj-wanu, Japonsku a Koreji v podobě opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)m při průměru kmene do 50cm. Borka je hladká a tmavě šedě hnědá. Listy jsou lichozpeřené, tvořené (7 -) 9 - 15ti lístky, dlouhé (15 -) 25 - 40cm, vlastní lístky jsou vejčité, špičaté, asymetricky zubaté nebo vroubkovitě pilovité, mírně lesklé, dlouhé 2,5 - 10cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze je široce klínovitá až kulatá, zkosená a spodní strana světle zelená. Květenství je dlouhé 8 - 15 (i 20)cm, tvoří ho žlutě zelené 4 - 5tičetné květy. Plody jsou vejčité až kulaté, červené až černé peckovice o průměru 6 - 7mm s vytrvalým kalichem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *glabrescens*
- var. *quassioides*

<https://www.rostliny.net/>