

Aquilaria microcarpa

synonyma: *Aquilaria borneensis*, *Aquilariella borneensis*, *Aquilariella microcarpa*

čeleď: Thymelaeaceae

oblasti: Borneo, Malajsie, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Malajském poloostrově, Sumatře, Borneu a Singapuru v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m při průměru kmene do 80cm. Borka je šedá, větve jsou bledě hnědé a zprvu drobně ochlupené. Listy jsou úzce eliptické až úzce obvejčité nebo obkopinaté, špičaté až zašpičatělé v délce až 1cm, prakticky kožovité, lesklé, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze je klínovitá až protáhlá, žilnatinu tvoří 12 - 19 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je úžlabní nebo nadúžlabní, vrcholové nebo na krátkých postranních větvích, zpravidla větvené, 6 - 11tkvěté, má až 1cm stopku, vlastní květy mají kališní laloky vejčité až podlouhlé nebo tupé, oboustranně ochlupené, koruna je bílá až žlutá a dlouhá 5mm. Plodem je prakticky srdčitá mírně zploštělá tobolka délky 0,8 - 1,6cm, šířky 1 - 1,5cm a obsahuje 1 - 2 vejčité ochlupená semena délky 6mm a šířky 4mm.

<https://www.rostliny.net/>