

# Centella asiatica (Pupečníkovec asijský)

synonyma: *Hydrocotyle asiatica*, *Trisanthus cochinchinensis*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Čína, Havajské ostrovy, Indie, Írán, J Afrika, Japonsko, Jáva, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, Oregon, Pákistán, S Austrálie, Srí Lanka

Roste na Madagaskaru v Indii a Srí Lance, Íránu, Indonésii, Malajsii, Melanésii, Nové Guineji, Austrálii, atd. jako mokřadní trvalka. Dorůstá výšky (2,5 -) 8 - 10 (i 15)cm, ale poléhavé nebo převislé výhony jsou dlouhé až 2 (i 2,5)m. Listy jsou zelené, ledvinovité, zoubkaté, dlouze řapíkaté a chuťově sladkohořké. Kvetे drobnými růžovofialovými oboupohlavnými květy ve (2 -) 3 - 4 (i 7)mikvětých svazečcích pod listy, vlastní květy jsou bílé a kalich je zubatý. Plodem je dvounažka, jsou vejčité až kulovité a dlouhé 2 - 3mm. Nať a listy se používají v léčitelství.

Není mrazuvzdorný. Lze jej pěstovat ve standardním substrátu. Zálivka musí být bohatá, na zimu zmírněná s min. teplotou 10 - 15°C. Lze jej pěstovat v závěsném truhlíku.

Množí se řízkem, zakořeňováním výhonů v uzlicích nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>