

Dionaea muscipula (Mucholapka podivná)

synonyma: *Dionaea corymbosa*, *Dionaea crinita*, *Dionaea dentata*, *Dionaea heterodoxa*, *Dionaea muscipula*, *Dionaea sensitiva*, *Dionaea sessiliflora*, *Dionaea uniflora*, *Drosera corymbosa*, *Drosera sessiliflora*, *Drosera uniflora*

čeleď: Droseraceae

oblasti: Florida, Jižní Karolína, New Jersey, Severní Karolína

Roste v USA jako trvalka. Stonek dosahuje výšky 3 - 7cm. V substrátu vytváří cibulku. Vytváří přízemní růžici ze 4 - 7 různě dlouhých listů a její průměr dosahuje 7 - 14 (i 20)cm, konce listů jsou uzpůsobené pro lapání hmyzu a řapíky jsou křídlaté. Past je opatřena citlivými chloupky a ostnitými výstupky. Ke sklapnutí pastí dochází během 0,2 - 0,5s. Rozevívá se po 2 - 3 dnech. Tento koloběh dokáže každý list udělat pouze 3 - 6x, pak odumírá. Kvete bílými 5tičetnými květy na 30cm stonku. Plodem je černá tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Akai Ryu'
- 'B52'
- 'Big Mouth'
- 'Bohemian Garnet'
- 'Clayton's Red Sunset'
- 'Cupped Trap'
- 'Clumping Cultivar'
- 'Český Granát'
- 'Dentate'
- 'Dentate Traps'
- 'Fused Tooth'
- 'Green Dragon'
- 'Holland Red'
- 'Jaws'
- 'Justina Davis'
- 'Kinchyaku'
- 'Korean Melody Shark'
- 'Korrigans'
- 'Louchapates'
- 'Microdent'
- 'Mirror'
- 'Perlite Dragon'
- 'Red Burgundy'
- 'Red Piranha'
- 'Red Rosetted'
- 'Royal Red'
- 'Sawtooth'
- 'Scarlet Bristle'
- 'Wacky Traps'

Vyžaduje maximum světla. Zaléváme dešťovou vodou. Květináč by měl být stále ponořený v několika cm vody. Důležitá je také vyšší vzdušná vlhkost, nepoužíváme ale rosení. Substrát ji vyhovuje buď čistě rašelinný nebo s příměsí písku. Vyhovuje jí teplotní rozmezí 18 - 26°C. Je mrazuvzdorná do -7°C, ale ideální teplota přezimování je 10°C. Dobře odolává požárům. Nepřihnojuje se!

Množí se drobnými černými semeny nebo listovými řízky.

<https://www.rostliny.net/>