

Mentha x rotundifolia (Máta huňatá)

synonyma: *Mentha spicata* var. *rotundifolia*, *Mentha sylvestris* var. *niliaca*, *Mentha viridis* var. *cana*, *Mentha x anglica*, *Mentha x burckhardtiana*, *Mentha x clandestina*, *Mentha x fragrans*, *Mentha x microstachys*, *Mentha x niliaca*, *Mentha x niliaca* var. *lurida*, *Mentha x niliaca* var. *melaneilema*, *M. f. ambigua*, *M. f. clandestina*, *M. f. cordifolia*, *M. f. exstans*, *M. f. pachystachya*, *M. f. rugosa*, *M. f. thierseana*, *M. subsp. oblongifolia*, *M. var. apodysa*, *M. var. bauhinii*, *M. var. bella*, *M. var. brachytricha*, *M. var. clandestina*, *M. var. crematophylla*, *M. var. expallens*, *M. var. fragrans*, *M. var. psilostachya*, *M. var. rugosa*, *M. var. segorbensis*, *M. var. semeiodes*, *M. var. trevirani*, *Mentha x villosa*, *Mentha x villosa* f. *burckhardtiana*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Irsko, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Pennsylvania, Polsko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Jedná se o křížence *M. spicata* x *M. suaveolens* x *M. villosa*. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1,2 (i 1,3)m. Má plazivé výběžky, je hustě chlupatá. Listy mají eliptický tvar s pilovým okrajem, délku 6 - 9cm a žilnatinu tvoří 8 - 10 (i 12) párů žilek. Kvete v mohutném lichoklasu, kalich je zvonkovitý, ochlupený, dlouhý 1,6 - 2,2 (i 2,5)mm, až z 1/2 3úhle cípatý a koruna je světlorůžová. Plodem je tvrdka.

Vyhovují ji rumišťe, okraje cest, vlhké trávníky, atp.

Množí se výhony.

<https://www.rostliny.net/>