

Acer cappadocicum (Javor kapadocký)

synonyma: *A. f. barbinerve*, *A. f. glaucum*, *A. f. rubrocarpum*, *A. var. glabrescens*, *A. var. indicum*, *A. var. stenocarpum*, *Acer colchicum*, *Acer laetum*, *Acer laetum f. rubrum*, *Acer laetum f. tricolor*, *Acer laetum f. viride*, *Acer laetum var. colchicum*, *Acer lobelii f. horticultum*, *Acer lobelii subsp. laetum*, *Acer lobelii var. colchicum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Gansu, Gruzie, Himálaj, Hubei, Írán, Itálie, Japonsko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Nepál, Pákistán, Shaanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Turecku, Íránu, Kavkazu, Himálaji a Číně v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 30)m a šířky 15m v široce sloupovitém habitu. Borka je hladká, hnědá nebo šedohnědá. Mladé větve jsou obvykle ojíněné, lesklé, zelené až červenohnědé. Vstřícné listy jsou dlanité, dlouhé i široké 4 - 15 (i 20)cm, lesklé, zelené (na podzim žluté), mají (3 -) 5 - 7 zašpičatělých celokrajných laloků, střední je 3úhle vejčitý, řapíky jsou dlouhé (3 -) 5 - 12cm a při zlomení roní bílé mléko. Kvete 6 - 8mm žlutozelenými kvítky s 5ti korunními lístky po 15 - 30ks v chocholičnatých hroznech nebo latách o délce 6 - 15cm, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm a široké 1mm, korunní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm a široké 1,5mm. Plodem jsou okřídlené 2nažky s křídlem délky 2,5 - 3cm svírající úhel téměř 180°. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureum' - výška 15m; žlutolistý, při rašení načervenalý až nafialovělý, podzimní barva žlutá až žlutohnědá
- var. *brevialatum* - Tibet; listy délky 5 - 6cm, šířky 6 - 8cm; křídla nažky délky 2,8 - 3,2cm
- var. *cappadocicum*/*A. laetum*/*A. laetum var. cultratum* - Turecko až Čína; listy délky 12 - 18cm, šířky 14 - 20cm; křídla 2nažek délky 4,5 - 5cm
- var. *cultratum* - listy 5tilaločnaté, báze uťatá
- var. *indicum* - Himálaj, Yunnan; výška 6 - 8m; mladé větve červenohnědé, neojíněné, s lenticelami; listy na obou stranách kolem centrálního žebra hedvábité; širší načervenalá křídla nažek
- subsp. *lobelii* - endemit Itálie
- var. *sinicum*/subsp. *sinicum*/*A. cultratum* - Yunnan, Sichuan, Himálaj; hustěji větvený strom; výška 20m; mladé větve červenohnědé, hustě tečkované; listy 5tilaločné, dlouhé 6 - 10cm, laloky užší a delší, v mládí hnědozelené, později měďnaté, na podzim žluté; křídla 2nažek délky 2,5 - 3cm
- 'Rubrum'/'Horticola'/*A. colchicum* 'Rubrum'/'*A. laetum* 'Rubrum' - mladé větve načervenalé; sytě rudé mladé listy, později zelené, na podzim žluté
- var. *tricaudatum*/f. *tricaudatum*/*A. laetum var. tricaudatum* - Gansu, Hubei, Shaanxi, Sichuan, Yunnan; výška až 9m, borka tmavěšedá, mladé větve holé, šedé; listy 3 (i 5)tilaločné, laloky ocasovité, délka 5 - 7cm, šířka 4 - 6cm, křídla 2nažek dlouhá 2 - 3cm, vzájemně do pravého úhlu
- 'Tricolor' - nízký strom; mladé větve jsou růžovočervené; mladé listy růžové, později bíle pomoučené a skvrnitě

Vytváří velké množství kořenových výmladků.

<https://www.rostliny.net/>