

Acer macrophyllum (Javor velkolistý)

synonyma: *Acer auritum*, *Acer dactylophyllum*, *Acer hemionitis*, *Acer leptodactylon*, *A. f. angustialatum*, *A. f. imbricatum*, *A. f. kimballiae*, *A. f. rubrifolium*, *A. f. rubrum*, *A. f. tricolor*, *A. subsp. kimballiae*, *A. var. brevialatum*, *A. var. imbricatum*, *A. var. kimballiae*, *Acer murrayanum*, *Acer platypterum*, *Acer politum*, *Acer stellatum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste na západě Severní Ameriky v podobě opadavého vícekmenného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 35)m, ale obvykle pouze 15 - 20m. Mladé větve jsou holé, zelené. Největší listy mají napříč 15 - 30 (i 35)cm, jsou hluboce dlanitě 5tilaločnaté až 5tiklané, centrální lalok je opět 3laločný, ostatní mají nepočtené velké a tupé zuby, horní strana je leeská tmavězelená, spodní světlejší, v mládí ochlupená, podzimní barva je žlutá až oranžová, řapíky při poranění roní mléko, jsou dlouhé 1 - 2,5 (i 3)cm. Kvete v 10 - 15 (i 35)cm převislých latich žlutozelenými vonnými květy. Plodem je párovitá 4 - 7cm nažka, pouzdro semene je žlutě štětinaté a křídle délky 4 - 5cm svírá pravý úhel. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Kimballiae'/f. *kimballiae* - pomalu roste, obvykle keřovitý; listy velikosti 8 - 20m, hlouběji laločnaté, někdy složené ze 3 - 5ti lístků
- 'Mocha Rose' - mladé a někdy i dospělé listy sytě hnědorůžové
- f. *rubrifolium* - mladé listy červené
- f. *rubrum*'/Rubrum' - mladé listy tmavěčervené nebo červenobroznové, později zelenočervené
- 'Seattle Sentinel' - v mládí sloupovitý, později široce sloupovitý; výška 18 - 24m, šířka 6 - 8m; listy na podzim žluté
- 'Tricolor' - při rašení růžové až červené skvrny, později bílé skvrnité nebo pouze téměř zelené

<https://www.rostliny.net/>