

# Acer laevigatum

synonyma: A. f. angustum, A. var. angustum, A. var. dimorphifolium, A. var. salweenense, Acer oblongum var. angustum, Acer reticulatum

čeleď: Sapindaceae

oblasti: J Čína, JV Čína, Myanmar (Barma), Nepál, S Indie, Sikkim, Střední Čína, V Čína, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru, Nepálu a Vietnamu. Patří mezi stálezelené stromy dorůstající výšky 10 - 15m při průměru kmene do 50cm. Borka je šedá. Mladé větve jsou načervenalé, holé. Listy jsou nelaločnaté, kožovité, celokrajné nebo jemně pilovité, špičaté, báze široce klínovitá nebo klínovitá, olivově zelené, na spodní straně bledězelené, při bázi žilné, řapíky nejsou červené, dlouhé 1 - 1,5cm, celková délka je 6 - 15cm a šířka 3 - 5cm. Plodem je 4 - 7cm nažka s 3 - 4cm křídlem. Křídla svírají pravý nebo tupý úhel. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. dimorphifolium - Čína; drsnější celokrajné nelaločnaté listy s oválnou bází
- var. laevigarum/A. hainanense/var. angustum/A. oblongum var. laevigatum - Čína, Myanmar, severní Indie, Nepál, Sikkim; holé řapíky; květenství včetně stopek holé
- var. salweenense/A. salweenense - Yunnan

<https://www.rostliny.net/>