

Acer sempervirens (Javor krétský)

synonyma: *Acer creticum*, *Acer creticum* var. *cuneifolium*, *Acer creticum* var. *rotundifolium*, *Acer heterophyllum*, *Acer humile*, *Acer monspessulanum* var. *orientale*, *Acer orientale*, *Acer orientale* f. *cuneifolium*, *Acer orientale* f. *ovale*, *Acer orientale* f. *rotundifolium*, *Acer orientale* var. *cuneifolium*, *Acer orientale* var. *ovale*, *Acer orientale* var. *rotundifolium*, *Acer virens*, *Acer willkommii*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Anglie, Kréta, Řecko, Turecko, Z Evropa

Pochází ze svahů Řecka včetně Kréty. Byl zavlečen do západní Evropy, včetně Británie. Jedná se o stálezelnou nebo poloopadavou rostlinu, které opadáva pouze příležitostně. Dorůstá výšky i šířky 3 - 5 (i 9 - 10)m při průměru kmene 50cm v podobě keře nebo nízkého stromu. Borka je tmavěšedá. Mladé větve mohou být jemně plstnaté. Vstříčné listy mají tmavězelenou barvu se spodní stranou světlejší, kožovitý povrch, mělce nebo až neznatelně 3laločné a s krátkým řapíkem, délku 1 - 4cm a šířku 1 - 3cm. Kvete žlutozelenými květy v 2cm dlouhých max. 5tkvětých chocholících. Plodem je světležlutá nažka s 1,5 - 3cm křídélkem. Křídla svírají ostý úhel nebo jsou paralelní, dlouhé 1 - 1,5cm.

Patří mezi nejvíce sucho a teplo tolerantní javory. Roste na slunečných stráních ve středních výškách.

<https://www.rostliny.net/>