

Acer barbatum (Javor vousatý)

synonyma: A. var. longii, A. var. villipes, Acer floridanum, Acer floridanum var. longii, Acer floridanum var. villipes, Acer nigrum var. floridanum, Acer rubrum var. barbatum, Acer saccharinum var. floridanum, Acer saccharum subsp. floridanum, Acer saccharum var. floridanum, Saccharodendron barbatum, Saccharodendron floridanum

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v USA od jihovýchodní Virginie po střední Floridu. Patří mezi středně vysoké opadavé stromy. Dorůstá výšky 8 - 20 (i 38)m. Habitus je okrouhlý, hustý. Borka má světle šedou barvu s nepravidelnými vráskami. Mladé větve mají hnědočervenou barvu a jsou holé. Vstříčné listy jsou jednoduché, dlanitě 3 - 5x vejčtě laločnaté, dlouhé 3 - 9,5 (i 15)cm a široké 3,5 - 11cm, okraj je zvlněný, báze uťatá nebo mírně srdčitá, laloky špičaté nebo tupé, mají 1 - 2 zuby, spodní strana je ochlupená, modrozelená, na zimu se barvu do oranžova a žluta a délka řapíku je 2 - 8cm. Kvete žlutozelenými dlouze stopkatými květy ve vzpřímených chocholících velikosti 3cm. Párovité nažky mají včetně křídel délku 2 - 3cm, křídla jsou nahnědlá a papírovitá.

<https://www.rostliny.net/>