

Acer barbinerve (Javor vousonervý)

synonyma: A. f. glabrescens, A. var. chanbaischanense, A. var. glabrescens, Acer diabolicum subsp. barbinerve, Acer megalodum, Acer miyabei var. shibatae, Euacer barbinerve

čeleď: Sapindaceae
oblasti: Korea, SV Čína

Roste v Číně, Mandžusku a Koreji v podobě nízce zavětveného keře nebo i stromu. Dorůstá výšky 10 - 12m. Habitus je široce vejčitý. Borka je hladká, šedá. Mladé větve jsou zelené nebo vzácně načervenalé, ochlupené, později šedé, lysé. Listy jsou tmavězelené, 5 (i 7)laločné, dlouhé i široké 5 - 12cm, na mladších větvích i větší, tenké, blanité, v mládí na spodní straně chlupaté, báze je srdčitá, vzácně uťatá nebo téměř zaoblená, okraj hrubě 2x pilovitý, centrální lalok nápadně větší, listy na sterilních větvích větší, hlouběji rozeklané a řapíky má delší než 6cm. Květenstvím je vzpřímený hrozen nebo chocholík velikosti 6 - 7cm. Květy jsou žluté, stopky dlouhé 1 - 2cm, kališní lístky jsou 4, podlouhlého tvaru, 4 jsou i okvětní lístky tvaru obvejčitě eliptického se 4mi tyčinkami. Plodí obvykle po 5 - 7ks, pouzdra semen jsou téměř kulovitá, dlouhá 1cm, široká 8mm, celá nažka má délku 3 - 3,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. glabrescens - Korea; holé listy

<https://www.rostliny.net/>