

Acer caesium (Javor modrošedý)

synonyma: *A. subsp. giraldii*, *Acer luteolum*, *Acer molle*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Bangladéš, Himálaj, Indie, Nepál, Pákistán, Sichuan, Yunnan

Roste od Bangladéše po Čínu. Dorůstá výšky až 25m (v kultuře vázcně více než 15m). Mladé větve jsou krátké, pevné, modře ojněné, později hnědé. Listy bývají 3 - 5laločnaté, tenké, dlouhé 11 - 21cm, široké 11 - 14cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 (i 7) žilek, báze je srdčitá, spodní strana modrozelená, později holá, spodní laloky jsou drobné, občas 3laločné nebo s vnějšími velmi malými laloky a řapíky jsou dlouhé 5 - 15cm. Kvete ve vzpřímeném chocholíku o velikosti 10cm, květy jsou zelenobílé až žlutozelené, průměru 5mm, kališní lístky dlouhé 3 - 4 (i 5)mm, široké 3mm, korunní lístky jsou obkopynaté, kratší kališních lístků, široké 1,5mm a pouzdra mají v průměru 8mm. Plodem je nažloutlá nažka délky 4,5 - 5,5cm.

<https://www.rostliny.net/>