

## Acer campbellii (Javor Campbellův)

synonyma: *A. subsp. schneiderianum*, *A. var. serratifolium*, *A. var. yunnanense*, *Acer schneiderianum*, *Acer schneiderianum* var. *pubescens*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Himálaj, Sikkim, Z Čína

Roste v Himálaji, Číně a Sikkimu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 18 - 20 (i 30)m, v kultuře menší. Mladé větve jsou načervenalé, holé, později šedohnědé. Mladé listy jsou bronzověčervené, později nazelenávají, 5 - 9laločné, dlouhé 9 - 22cm, dlanité, laloky vejčité nebo kopinaté, ocasovité, jemně pilovité, báze zaoblená, uťatá nebo srdčitá, na spodní straně jsou chomáčky chloupků v paždí žilek, řapíky jsou načervenalé, dlouhé 4 - 8cm. Kvete v až 15cm dlouhých latách, korunní lístky jsou bílé, kališní nažloutlé, vejčité, dlouhé 3mm a široké 2,5mm. Plody mají křídla délky 2 - 2,5cm a šířky 7mm a jsou k sobě vodorovně uspořádaná. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Exuberance' - výška 4,5 - 6m, šířka 3,6m; lity tmavězelené nebo zelené, na okraji mírně zastříhované, podzimní barva je červená, žlutá nebo oranžová s červeným okrajem
- var. *serratifolium* - žilky na spodní straně ochlupené

<https://www.rostliny.net/>