

Acer fabri

synonyma: *A. f. rubrocarpum*, *A. var. dolichophyllum*, *A. var. gracillimum*, *A. var. megalocarpum*, *A. var. rubrocarpum*, *A. var. tongguense*, *A. var. virescens*, *Acer fargesii*, *Acer laevigatum* subsp. *reticulatum*, *Acer laevigatum* var. *fargesii*, *Acer laevigatum* var. *fargesii*, *Acer prainii*, *Acer reticulatum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Střední Čína, Yunnan

Roste v Číně. Dorůstá výšky až 18m většinou v podobě stálezeleného (někdy opadavého) stromu. Borka je lesklá a šedá. Mladé větve jsou tenké, v mládí červené, později šedozelelé. Listy jsou podlouhlé až úzce obvejčité nebo obkopinaté, špičaté, celokrajné nebo jemně pilovité, kožovité, z obou stran lesklé a tmavězelené, spodní strana je světlejší, řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm, celková délka je 4 - 15cm a šířka 2 - 4cm. Květenství je vzpřímené a hroznovité. Kališních lístků je 5, jsou podlouhlé, okvětních lístků je také 5, jsou růžovofialové, obvejčité a semeníky jsou holé. Nažky jsou hnědožluté, dlouhé 2,5 - 4,8cm, široké 0,8 - 1cm, křídla jsou červená, pouzdra semen o průměru 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *fabri*/*A. laevigatum* subsp. *reticulatum*/*A. laevigatum* var. *reticulatum*/*A. pubipetiolatum* var. *pingpienense*/*A. reticulatum* - čepel je kopinatá nebo obkopinatá; nažky délky 3 - 4cm, křídla červená

- var. *gracillimum* - jihozápadní Guangdong; listy délky 4 - 4,5cm, šířky 2 - 2,5cm; okvětní lístky délky 1cm; nažky délky 1,8 - 2cm

- var. *megalocarpum* - Yunnan; eliptické listy; holé květenství; nažky délky 3,5 - 4,5cm

- var. *virescens* - Guangxi; čepel kopinatá; květenství ochlupené; nažky délky 4,5 - 4,8cm

<https://www.rostliny.net/>