

Acer flabellatum (Javor vějířovitý)

synonyma: *Acer campbellii* subsp. *flabellatum*, *Acer campbellii* var. *heptaphlebium*, *Acer campbellii* var. *yunnanense*, *A. var. yunnanense*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Guangxi, Guizhou, Hubei, Jiangxi, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 9m. Mladé větve jsou jemně ojíněné a šedé. Listy jsou 7milalochné, na bázi hluboce srdčité, laloky jsou dlouze vejčité, vzácně 3úhle vejčité, hrubě pilovité, špičaté, lesklé, tmavězelené, na spodní straně světlejší, v mládí načervenalé a řapíky dlouhé 4 - 5cm. Květenství je zelenožluté ve tvaru vzpřímeného chocholíku. Květy mají 1mm stopky, kališní lístky vejčitékopinaté, dlouhé 3mm, okvětních lístků 5ks, jsou obvejčité a semeníky jsou holé. Nažky mají široce rozevřená hnědočervená křídla, celkovou délku 3 - 3,5cm, šířku 1 - 1,2cm a pouzdra semen jsou dlouhá 6mm a široká 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *yunnanense*/*A. campbellii* subsp. *flabellatum* var. *yunnanense* - mladé větve tenké, načervenalé, holé; listy hluboce 5 - 7milalochnaté, laloky vejčité, jemně pilovité, řapíky červené; květy tmavé modrozelené seskupené do chocholíků; křídla plodů jsou načervenalá

<https://www.rostliny.net/>