

Acer heldreichii (Javor heldreichův)

synonyma: A. f. cruciatum, A. f. macropterum, A. f. obtentum, A. subsp. visianii, A. var. macropterum, Acer macropterum, Acer visianii

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Bulharsko, Řecko, Srbsko

Pochází z lesů Balkánského poloostrova. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)m a šířky 15m v široce sloupovitém habitusu. Borka je šedohnědá až šedorůžová, hladká, rozpraskaná. Mladé větve jsou hnědé, olivové až tmavě červenohnědé, pupeny jsou ostře špičaté, tmavé, červenohnědé. Vstřícné listy jsou hluboce, téměř až k bázi, vykrojené do 3 - 5 laloků s pilovým okrajem, kopinatým tvarem, lesklým tmavězeleným povrchem, spodní stranou žlutozelenou, na žilnatině ochlupenou, celková šířka je 5 - 14 (i 20)cm, řapíky jsou načervenalé, dlouhé 4 - 6cm. Na podzim přecházejí do žluté nebo červené. Kvete drobnými žlutými květy ve vzpřímených kuželovitých chocholících nebo lotech. Plodem je křídlatá nažka délky 3,5 - 5cm s křídly rozevřenými do oblouku. Existují vnitrodruhvé taxony:

- subsp. heldreichii - listy velikosti 5 - 8cm se spodní namodralou stranou
- subsp. macropterum - větší plody
- f. purpuratum - spodní strana listů červená
- subsp. visianii/A. macropterum - Jugoslávie, západní Bulharsko; listy délky až 14cm; spodní strana je nepatrně namodralá

<https://www.rostliny.net/>