

Acer lobelii (Javor Lobelův)

synonyma: *Acer cappadocicum* subsp. *lobelii*, *A. f. normale*, *A. subsp. tenorei*, *Acer platanoides* var. *integrilobum*, *Acer platanoides* var. *lobelii*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: J Itálie, Jugoslávie

Pochází z horských lesů jižní Itálie a západního Balkánu. Patří mezi opadavé rostliny. Dorůstá výšky 15 - 20 (i 25)m a šířky 6m v úzce sloupovitém habitu. Borka je světle šedá, úzce rozpukaná. Mladé větvičky jsou do dalšího roku zeleně ojněné. Vstřícné lesklé tmavězelené listy se světlejší spodní sivozelenou stranou mají délku i šířku 6 - 12 (i 15)cm, 5 laloků s protáhlou špičkou, zvlněný okraj a mohou být také řídce pilovité. Na podzim se barví do žluta. Při poranění řapíku roní bílou tekutinu, řapíky jsou zelené, dlouhé 6 - 12cm. Kvete žlutozelenými květy s 5ti okvětními lístky. Plodem je 2,5 - 3cm 2nažka nažka s křídélkem svírající úhel téměř 180°. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'De Oirsprong' - úzký vzpřímený habitus; žluté listy
- 'Lobel' - úzce sloupovitý habitus
- var. *dissectum*/*A. cappadocicum* var. *dissectum* - stříhané listy

<https://www.rostliny.net/>