

Acer mandshuricum (Javor mandžuský)

synonyma: *Acer kansuense*, *Acer mandschuricum*, *A. subsp. kansuense*, *Crula mandshurica*, *Negundo mandshurica*, *Negundo mandshuricum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Gansu, Heilongjiang, Jilin, JV Sibiř, Korea, Liaoning, S Asie

Roste v Číně, v Koreji a při pobřeží jihovýchodního Ruska. Patří mezi opadavé stromy. Dorůstá výšky 10 - 30m, ale obvykle je nižší. Borka je hladká, šedá nebo hnědošedá. Mladé větve jsou holé, červenohnědé. Listy jsou složeny ze 3 samostatných eliptických až kopinatých pilovitých špičatých lístků dlouhých 7 - 10cm a širokých 1,5 - 3cm. Barva je tmavězelená až modrozelená, spodní sivozelená, podzimní barva je červená nebo žlutozelená. Kvete žlutozelenými květy s 5ti okvětními i kališními lístky, okvětní jsou vejčité, dlouhé 7 - 8mm. Nažky mají délku 3 - 3,5 (i 6)cm, šířku 1cm a pouzdra semen jsou kulovitá. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *kansuense*/*A. kansuense* - jihovýchod Gansu; lístky podlouhlé nebo dlouze vejčité, na spodní straně podél žilek holé, délka 5 - 8cm a šířka 2 - 3cm
- subsp. *mandshuricum*/*Crula mandshurica*/*Negundo mandshuricum* - Heilongjiang, Jilin, Liaoning; lístky kopinaté nebo dlouze kopinaté, na spodní straně ochlupené podél centrálního žebra, délky 5 - 10cm a šířka 1,5 - 3cm

<https://www.rostliny.net/>